



29819/2/1

F XVIII. 14

29819/2/1

20/12/11



OBSERVATIONES HUXHAMII  
DE AËRE,  
ET  
MORBIS EPIDEMICIS,

Ab Anno 1749 ad Exitum usque Anni  
1752.

TOMUS TERTIUS.

A Patris Manuscripto edidit.

J. COR. HUXHAM, A.M. R.S.S.

---

Ἰητρὸς ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων. Hom. Iliad, Lib.  
xi. Ver. 514.

---



---

L O N D I N I :

Impensis JOANNIS HINTON, ad *Arma Regia*, in  
Vico dicto *Pater-noster Row*. MDCCLXX.

Digitized by the Internet Archive  
in 2019 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30545493>

VIRO DOCTISSIMO, & DIGNISSIMO,

*JACOBO WEST*, ARMIGERO,

REGIÆ SOCIETATIS LONDINENSIS

OPTIME MERENTI PRÆSIDI,

E T

SOCIIS CELEBERRIMIS,

HAS HUXHAMII OBSERVATIONES

DE AËRE, & MORBIS EPIDEMICIS,

SUMMA OBSERVANTIA

D. D. D.

J. COR. HUXHAM.



# LECTORI

S.

SCRINIA Patris mei optimi, & eruditi, perscrutanti, Observationes frequentes de Aëre & Morbis Epidemicis pulchrè transcriptæ mihi occurrebant. Inventis gaudebam.—Et quum priora sua Opera non solum placuisse, sed etiam prodesse, omnes consentiunt: Has Observationes Publico minimè ingratas fore credidi.—Prælo igitur lubenter commisi: Et siquid Commodi, aut Utilitatis, hinc recipiant Imbecilli & Ægrotantes, summâ me afficiet Voluptate.—Vale, candide Lector, & his utere mecum.—



[ 1749 ]

D E A Æ R E,

E T

Morbis Epidemicis,

ANNO MDCCXLIX.

**E**XIIT Annus 1748 continuas inter Pluvias, Procellas atque Diluvia; nec utique lætiore Vultu intrat præsens, quinimo certe pejore—toto ruit Æthere Nimbus—Limo conteguntur omnia & Aquâ, Aër humidissimus ac caliginosus maxime, Cælum tristissimum, Libs fere perpetuus, sæpe furens admodum; dira haud raro Fulgura, Pluviæ Quantitas plane stupenda.—Longe acerbissima Frigora prope *Moscow* à 10 ad 14. Prudenter adeo olim instituerunt Majores nostri hoc Anni Tempore, Ludos, Epulas Foca luculenta, ad fallenda nimirum solita gravis hujus Tempestatis Incommoda.

Pluvia

Pluvia  $\frac{''}{1.}$   $\frac{'''}{2.}$   $\frac{'}{3.}$   $\frac{''}{4.}$   $\frac{''}{5.}$   $\frac{'}{6.}$   $\frac{''}{7.}$   $\frac{''}{8.}$   $\frac{'''}{9.}$   $\frac{'''}{10.}$   $\frac{'}{11.}$   
 $\frac{''}{12.}$   $\frac{'''}{13.}$   $\frac{'''}{14.}$   $\frac{'}{15.}$   $\frac{''}{16.}$   $\frac{'''}{17.}$   $\frac{'''}{18.}$   $\frac{''}{19.}$   $\frac{''}{20.}$  21. 22.  
 —  $\frac{'}{23.}$   $\frac{'''}{25.}$   $\frac{'''}{26.}$   $\frac{'}{27.}$   $\frac{''}{30.}$  31. Grando 11.  
 Dig. Dec.  
 16. 22. 23. Nix 28. = 8. 808.

Fulgur & Tonitru sævissima 10 toto ferè  
 Die—11 gravia p. m. Fulgura lucidissima  
 15 Vesperis. Fulgur & Tonitru 17 Nocte.  
 Procella 1 Nocte S b W 4<sub>x</sub>.—7 Nocte  
 S S W 4<sub>x</sub>.—9 Noctu S W b W 4<sub>x</sub>.—10 &  
 11 W S W 4—15 S W 4—22 Nocte N  
 W 4.

Immensi Maris Æstus 10 & 11 Littora  
 ubique inundantes—Rigidum Gelu 28 &  
 29. N N E 1<sup>x</sup>.

§ Altitudo maxima 29. 30. 1 N N E 1<sup>x</sup>. } media 29. 3 $\frac{22}{11}$ .  
 — minim. 11. 28. 3. W S W 4. }  
 Dies frigid. 29. 72. — }  
 — tepid. 5. 48. S W b W 3<sup>x</sup>. } media 56 $\frac{2}{3}$ .

Variolæ plurimæ eæque plerumque be-  
 nignæ, præsertim ubi lenis accedit Alvi  
 Fluxus, qui jam fane Salivationis Vicem  
 præstare

præstare haud raro videtur, etiam in Adultis.

Perplurimi acri laborant Tussi ac Coryza cum Tumore Faucium Dentiumque Dolore acerbo—Perfrequens est Morbus Colicus, in quo † Alvus astricta admodum vix cedit Purgantibus fortissimis; sed hoc accidit utplurimum in Colica à Pomaceo impuro novello. Rheumatismi multi valde pertinaces.

Etsi Tempestas tam horrida regnat: pauci equidem sæviunt Morbi, saltem paucissimæ Febres quod utique, haud rarò notavi.

## FEBRUARIO.

Ab Initio *Februarii* Pluvia haud parca, interdum Libs, sæpe Corus, Aër densissimus; à decimo ab Oriente venit Ventus, vergens plerumque ad Austrum. Medio porro Mense Apricitas; ad Finem flante Vulturno Pluvia gravis: vix ulla Glacies hoc Mense.

---

† Vide Opusculum de Morbo Colico Damnonior: Ad Finem Vol. I. Pag. 5.



Pluvia  $\frac{''' }{1.}$   $\frac{' }{2.}$   $\frac{' }{3.}$   $\frac{'' }{4.}$  5. 6.  $\frac{'' }{7.}$  8. 16. 18. 23.  
 Dig. Dec.  
 25. 26.  $\frac{''' }{27.}$   $\frac{'' }{28.}$  Grando 2. 8. 25. = 2.820.

§ Altitud. maxim. 16. 30. 2. N E 1<sup>x</sup>. } media 29.6 $\frac{16}{8}$ .  
 ——— minim. 4. 28. 8. N W. 2. }  
 Dies frigid. 5. 63. N W b N 1<sup>x</sup>. } media 54 $\frac{21}{8}$ .  
 — tepid. 26. 52. S E 3. }

Permultæ adhuc Variolæ: Tuffes, Destillationes, ac Faucium Tumores maxime frequentes, multos Rheumatismus laceffit, multo tamen plures Morbus colicus acerbissimus cum Alvo durissima qui in Brachiorum Paralyfi interdum definit: Peripneumoniæ passim plerumque nothæ à nimia Colluvie Humorū unde etiam & quædam Febres catarrhales, quæ longe melius Purgantibus fugantur quam Sanguinis Misfione.

### MARTIO.

Incipiente *Martio* Ventus inconstans, Aër craffissimus; à 13° Eurus prævaluit; frigidior

frigidior hinc Tempestas, at lætior multo.  
Sub Finem Pluvia affatim.

Pluvia  $\frac{''}{1.}$   $\frac{''}{5.}$   $\frac{'}{6.}$   $\frac{'}{7.}$   $\frac{''}{9.}$   $\frac{''}{10.}$   $\frac{'''}{11.}$   $\frac{'}{12.}$   $\frac{'}{21.}$   $\frac{''}{23.}$   
Dig. Dec.  
 $\frac{'''}{24.}$   $\frac{'}{25.}$  26. 27. 28.  $\frac{'''}{29.}$  Nix 18 = 4.340.

AB. 7. H. 10. p. m. N W 1. levis.  
AB. 25. H. 9. E b S 2—27. H. 8. N  
E 1<sup>x</sup>. Rigidum Gelu 17. 18. 19.

⌘ Altitud. maxim. 15. E b N 3. 30.2. } media 29.6 $\frac{2}{3}$ .  
—— minim. 26. 29. 0. S E 3<sup>x</sup>. }  
Dies frigid. 18. 70. E N E 2. } media 53 $\frac{1}{2}$   
—— tepid. 30. 48. E 3. }

Plures usque Variolæ, Pleuritides & Peripneumonix aliquæ, frequens Rheumatismus. Tusses & acerbissimæ sæviunt multum, paucissimæ Febres tamen.—In omnibus pene Morbis dominari videtur serosa Colluvies.

### APRILI.

Ineunte & exeunte hoc Mense Ventus ab Oriente prævaluit, medio autem Libs, subinde Corus, Aër crassus; Initio autem, & ad Finem tenuis.

B

Pluvia

Pluvia  $\frac{'''}{3}$ .  $\frac{'}{4}$ . 5.  $\frac{'''}{10}$ . 11.  $\frac{''}{12}$ . 13. 15.  $\frac{'}{18}$ .  
 Dig. Dec.  
 19.  $\frac{'}{23}$ . 26. Grando 4=2.670.

AB. 6. H. 8. p. m. N N E 1<sup>x</sup>.—Per-  
 magna 7. H. 9. p. m. N b E 1—28 H.  
 10. E 1. Fulgur, Tonitru, & vehementissi-  
 ma Pluvia inundans prope *Oxoniam*, *Chel-*  
*tenham*, &c. 27, ne Gutta hic; ad N E  
 autem in *Exmore* Tonitru & Pluvia gravif-  
 sima eodem Die.

§ Altitud. maxim. 7. 30.0. N N E 1<sup>x</sup>. } media 29.5 $\frac{1}{2}$ .  
 ——— minim. 4. 28.8. S W 3. }  
 Dies frigid. 7. 60. } media 44 $\frac{2}{3}$ .  
 ——— calid. 28. 24. E 1. }

Variolæ jam plurimæ; at plerumque  
 benignæ. Pleuritides quædam & Peri-  
 pneumoniæ: atqui Tempestas est utpluri-  
 mum valde salubris.

### M A I O.

Fuit per Mensis Initia haud leve Frigus  
 pro Anni saltem Tempore, etiam ipsa  
 Glacies Mane 3° & 4°, Nix aliqua 3<sup>to</sup>;  
 Pluvia



Pluvia frequens ad 10<sup>m</sup> usque, Ventus inconstans—Post autem lætissima Tempestas, Sol fervidus, Aër ficcus ac pertenuis. Ventus plerumque Borealis, Barometer vero parum elatus.

Pluvia 3. <sup>1</sup>/<sub>4</sub>. 5. 6. 7. <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. <sup>1</sup>/<sub>9</sub>. 10. <sup>1</sup>/<sub>25</sub>. 26.  
Dig. Dec.

27. Nix & Grando 3° = 1.012.

AB. 1°. H. 9. N N E 1. maximus  
Globus igneus in Aëre visus ad S E circa  
Meridiem 17, qui displosus evanuit magnæ  
Pruinæ 28. 29.

§ Altitud. maxim.	13. 29. 8.	N b W 1.	} media 29.5 <sup>8</sup> / <sub>31</sub> ,
— — — minim.	5. 29. 1.	S 3 <sup>x</sup> .	
Dies frigid.	3. N 2. 53.	} media 33. <sup>10</sup> / <sub>31</sub> .	
— — — fervid.	17. 16. malacia.		

Variolæ adhucdum ; Peripneumonix  
aliquæ veræ, Tusses asthmaticæ plures :  
Tabæ pulmonaria pereunt multi. Angina  
valde maligna in *Cornubiâ* inter Pueros,  
circa St. *Austle*, *Lestwithiel*, &c. & oriri  
videtur Tabes hæc funesta ab acri Destil-  
latione ; quæ diu jam permultos laceffivit,  
imo & haud paucorum Pulmones erosit ;

unde Tussis importuna valde ac vehemens, tandemque nimis frequenter Sanguinis Sputum, atque demum in Bronchiorum Cavis Ulcera.—Huic igitur Malo occurrendum est quantocyus, mox aliter cita Phthisis sequitur—Hic adeo interpollet plurimum Balsamum naturale, quale nempe Gileadense, Copayba seu ipsa Terebinthina Chienfis. Quid valent ad Ulcuscula hæcce videmus clarissime in Gonorrhœa virulenta; sive Urethræ Ulcusculis; quæ nimis cito sæpe sanant, neque id quidem specifica quadam Virtute contra virulentum istud Profluvium, nam Ulcera fistunt, relicto Veneno.—Si tantum ergo valet in Urethra, quidni in Trachæ Fistulis?

## JUNIO.

*Junio* incipiente Pluvia, Ventus Septentrionalis, medio etiam, Pluvia subinde; sub Finem fervida Tempestas, nunc Coro nunc Africo spirante, Aër interim tenuis & ficcus.

Pluvia

Pluvia 1. <sup>/</sup> 2. <sup>//</sup> 3. 4. 5. 14. <sup>//</sup> 15. 16. <sup>///</sup> 17. 18.  
Dig. Dec.

Grando 3 = 1.892.

Fulgur & Tonitru ad Occidentem 5.  
Gravissima Procella cum Fulgure & Tonitru 17 à primo Mane S W 4<sup>x</sup>. AB. 26.  
H. 10. N b W 1.

§ Altitud. maxim. 27. 30.0. N b W 1. } media 29.5<sup>2</sup>/<sub>3</sub>.  
——— minim. 17. 29.0.  
Dies frigid. 16. 48. N 1.  
——— fervid. 28. 16. W S W 1<sup>x</sup>. } media 33<sup>7</sup>/<sub>8</sub>.

Variolæ aliquæ, Anginæ plurimæ mali admodum Moris in *Cornubia* circa *Liskeard*, *Lestwithiel*, *St. Austle*, perplures fane jugulant Pueros; paucæ etiam hic, & per viciniam.—Cæterum Tempeſtas eſt maxime ſalubris, rariffima Funera.

## JULIO.

Imbres frequentes medio, & Aër valde craſſus, Cœlum fervidiſſimum Initio; à 4 ad 10 omni Veſperi, mox poſt Solis Occaſum, innumeræ Nubes coccineæ pulcher-  
rimæ,



rimæ, Ventus varius hoc Menſe, Auſter attamen prævaluit.

Pluvia 2. 4.  $\frac{1}{12}$ . 13. 16. 17.  $\frac{1}{18}$ . 19. 20.  
Dig. Dec.

23. 24. 27. 28. 31 = 1.052.

Maxima Pruina 31. Levis Procella 15  
a. m. W S W  $4_x$ .

Ø Altitud. maxim. 9. 29. 9. N N E 1.	} media 29.5 $\frac{1}{2}$ .
—————minim. 12. 29. 3. W S W $2_x$ .	
Dies frigid. 18. 34. W S W $2^x$	} media 25 $\frac{1}{2}$ .
——longe fervidiſſima 1. 12. E b S 1	

Variolæ adhuc paſſim; Ophthalmiæ plurimæ; Febres quædam rheumaticæ & pleuriticæ, Colica multos torquet, per plurimos exercet Diarrhœa: Coryza, Tuſſis, ac Tumor Faucium frequentes. Cephalalgia & Hæmorrhagiæ haud paucos corripunt, ob Æſtum forte enormem.

### AUGUSTO.

Fuit & hic Menſis calidus, & ſiccus ſatis, præſertim poſt Diem ſextum, unde læta Meſſis optimumque Frumentum: Boreas sæpe flavit, sæpe Corus: ſub Finem  
Atmoſ-

Atmosphæra pertenuis. Maximæ subinde  
Rorationes.

Pluvia  $\frac{''}{2}$ . 3. 4.  $\frac{''}{5}$ .  $\frac{'}{6}$ .  $\frac{''}{10}$ . 14. 23.  $\frac{'}{31}$ . =  
Dig. Dec.  
1.572.

§ Altitud. maxim. 17. 29. 9. NE b E 1 } media  $29.5\frac{2}{8}$ .  
——— minim. 2. 29. 1. W N W 1 }  
Dies frigid. 31. 34. N 1. }  
——— fervid. 21. 20. E b S 2. } media  $27\frac{1}{2}\frac{3}{8}$ .

Jam paucae tantum Variolæ; Morbilli  
passim, Angina quædam ulcerosa maligna  
grassatur sparsim hic & per Viciniam;  
multo magis autem in *Cornubia*. Sæpe Fau-  
ces Gangræna corripuntur, sæpe interior  
Trachæa Membrana erosa frustatim ejici-  
tur; tumet plerumque Collum totumque  
fere Caput, rubet porro flagratque admo-  
dum quasi ex Igne sacro—rubent pariter  
tumentque Manus, Fœtor Oris exit teter-  
rimus, adest semper Anxietas intolerabilis,  
Jactatio perpetua, mox autem Delirium,  
aut maxima Somnolentia urget—Vomitio  
sæpissime accedit etiam ut plurimum, Alvi  
Fluxus olidissimus—tam acris sæpe effluit  
ex

ex Ore Sanies; ut Genas Labiaque etiam,  
& ipsas Manus erodit.

Plures Ophthalmia vexantur—Diarrhœa  
torminosa plurimi.—Perpauci aliter Mor-  
bi videntur, adeoque Funera sunt ra-  
rissima.

### SEPTEMBRI.

Diem decimum nonum ad usque *Septem-*  
*bris* Ventus varius, Corus frequenter,  
Libs subinde, Pluvia haud parca, Procel-  
la interdum, aliquando tamen Apricitas—  
à vicesimo Ventus ab Oriente Nubes discuf-  
sit, sudumque sæpissimè fecit Cœlum.

Pluvia 2. 3. 4. <sup>1</sup>5. 6. <sup>2</sup>10. <sup>3</sup>11. 12. <sup>2</sup>14. <sup>3</sup>15.  
Dig. Dec.  
<sup>2</sup>16. <sup>1</sup>17. <sup>1</sup>19. = 3.156.

Procella 2 Nocte S S W 4<sub>x</sub>.—16 S W  
4—19 Nocte S 4—20. E N E 4<sub>x</sub>.  
Nebula valde foetida, 10. Immenfus  
Maris Æstus 16 omnia inundans.

♀ Altitud. maxim. 28. 30.1. E N E 1. } media 29.7.  
——— minim. 16. 29.1.

Dies



Dies frigid. 17. 48. W N W 2. } media  $38\frac{1}{2}\frac{6}{8}$ .  
 — calid. 3. 32. W 3. }

Variolæ adhuc passim ; Morbilli & Rubeoli multi præcipue apud *the Dock* ; Anginæ plurimæ ; quædam etiam valde malignæ per Viciniam, hujus Generis autem plures longe apud *Liskeard, St. Austle, Lestwithiel, &c.* æque valde pestiferæ.—Multi vehementissimâ Cephalalgia perculsi sunt—Innumeri Tumore Faucium, Parotidum, Maxillarum, cum acerbosæpe Dolore corripuntur : Hos Alvi Fluxus jam perfrequens juvat semper.

Plures Puerperæ nunc Febre miliari graviter affectæ sunt.

## О С Т О В Р И .

Ad Diem vicesimum quartum *Octo-*  
*bris* alta fuit Baroscopii Statio, parca in-  
terim Pluvia, Aer ficcus, haud raro te-  
nuis, Ventus ab Arcto plerumque flavit,  
sæpe Boreas, sæpius Corus.

Pluvia 1. 2. 8. 12. 13. 17. 20. 21 22. 24.  
Dig. Dec.  
25. 28. 29. 30. 31=1.422  
C Maxima

Maxima Pruina, & Glacies 25 Mane  
NW 2. Nebulæ magnæ 22. 23. NNW 1.

§ Altitud. maxim. 10. 30. 3. ENE 2. } media 29.8  $\frac{1}{2}$  8.  
——— minim. 29. 29 2. SSE 2. }  
Diesfrigid. 30. 60. NNE 1. }  
——tepid. 7. 38. WNW 1<sup>x</sup> } media 46  $\frac{5}{2}$  9.

Variolæ jam multo magis frequentes;  
sed plerumque benignæ—Tumores Fau-  
cum, Colli, Parotidum, levi sæpe cum  
Anginâ valde frequentes, adhuc Mor-  
billi plurimi passim, præcipue apud *the*  
*Dock*. Perpauci aliter Morbi.

## NOVEMBRI.

Per Initia *Novembris* Pluvia multa, Auf-  
tro perflante, ab undecimo vix ulla, Ven-  
tus enim ab Oriente. Alta Mercurii Statio  
Cœlum autem nubilum plerumque, at-  
que crassum, ad Finem Gelu.

Pluvia 1.  $\frac{''}{2}$ .  $\frac{''}{3}$ .  $\frac{''}{4}$ .  $\frac{''}{5}$ .  $\frac{''}{6}$ .  $\frac{''}{7}$ .  $\frac{''}{10}$ . 25 = 2.146 Dig. Dec.  
Procella 7 Vesperis SSW 4<sub>x</sub>. Nebulæ  
foetidæ 3. 4. 8. 9. 19.

Altitud.

☿ Altitud. maxim. 18. 30.5. E N E 1x. } media 30.0 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{5}$ .  
 ——— minim. 5. 29.5. S b E 3x. }  
 Dies frigid. 30 62. E N E 1 }  
 ——— tepid. 8. 44. S W b S 2x. } media 53 $\frac{1}{2}$ .

Morbilli jam undique maxime epidemici, imo & sæpissime maligni, quippe Affectibus peripneumonicis stipati. Variolæ plurimæ—Tusses innumeræ—Tumores atque Dolores Dentium, Faucium, Parotidum, Maxillarum, &c. ubique—sæpe levis Angina, pauci aliter hic Morbi—apud *Isicanos* vero Febres mali admodum Moris epidemicæ, ac Morbilli valde lethales.

### DECEMBRI.

Perhumida fuit & crassa valde Atmosphæra toto hoc Mense; Barometer autem altum plerumque tenuit Locum, etsi multa interdum ruebat Pluvia à 15° ad 25<sup>m</sup> Ventus Orientalis prævaluit isque sane perfrigidus, hinc acre subinde Gelu.

Pluvia 1.  $\frac{1}{4}$ . 6.  $\frac{1}{7}$ . 8.  $\frac{11}{10}$ .  $\frac{1111}{1000}$ .  $\frac{1}{10}$ .  
 19.  $\frac{1111}{1000}$ .  $\frac{1}{10}$ . 30. Nix 12. 24=3.318.  
 Dig. Dec. C 2 Gravis



Gravis Procella 9 Nocte, & 10 Mane  
S W 4<sup>r</sup>—Jovis & Martis arctissima Con-  
junctio 22. H. 7. p. m.

§ Altitud. maxim. 21. 30. 5. E N E 2<sup>x</sup>. } media 29.8 $\frac{2}{3}$  $\frac{5}{1}$ .  
—— minim. 10. 29. 0.

Dies frigid. 24. 71. E N E 2. } media 58 $\frac{2}{3}$  $\frac{4}{1}$ .  
—— tepid. 9. 50. S W b W 3.

Durant usque Variolæ, Morbilli maxime  
sunt epidemici, imo & sæpe pestiferi—Pus-  
tulæ seu Maculæ non sunt ita fastigiatae;  
sed magis absconditæ aut luridæ, aut livi-  
dæ, iisque vanescentibus Tussis furibunda,  
sæpe ipsa Peripneumonia supervenit; sæpi-  
us autem Tormina sævissima atque Alvi  
Fluxus immanis—Pleuritides & Peripneu-  
moniæ frequentes. Colica biliosa, atrox,  
torquet plurimos, quorum Alvus est ple-  
rumque valde astricta, & solutu difficilis  
perquam, Tusses vehementes ac Faucium  
Collique Tumores apud omnes fere.

Tota Pluviæ Quantitas Anno 1749=  
Dig. Dec.  
34.208.

JANU-

## JANUARIO.

Alta fuit Barometri Statio hoc Mense,  
 Aer vero crassus admodum, & humidus;  
 Vulturnus perflavit sæpissime, præcipue  
 à 10 ad 23, Libs interdum, Aquilo rarissime,  
 Boreas nunquam—humida adeo atque ne-  
 bulosa Atmosphæra sustinuit Mercurium.  
 —Gelu nullum, imo vix aliqua Pruina.  
 9 Vesperi ♂ ♀ & ♀ formant Lineam rec-  
 tam.

Pluvia  $\frac{''}{1.}$   $\frac{''}{2.}$   $\frac{'}{3.}$  4.— 6.  $\frac{'}{7.}$   $\frac{''}{13.}$  14. 17.  $\frac{''''}{24.}$

25. 26. 27. 29.  $\frac{''''}{30.}$  31. Grando 3. 30.

$\frac{'}{}$  Dig. Dec.

31.=4.338.

Procella 24. S S W 4 & tota fere Nocte  
 —Gravis Procella à 29° ad Finem ipsum  
 Mensis cum maximis Maris Æstibus; etsi  
 Dies aliquot post Novilunium gravissima  
 Pluvia. Fulgur & Tonitru sævissimum  
 30 Nocte S W b W 4<sup>x</sup>. Lux insolita tota  
 Nocte à 23 ad Finem usque, etsi Cælum  
 erat Nubibus valde crassis abductum; præ-  
 cipue

cipue 29, 30, & 31, furente Procella.—  
Quod quidem non raro observavi.

☿	Altitud. maxim.	8.	30.4.	N	1.	} media 29.8 $\frac{1}{2}$ $\frac{6}{8}$ .
—	—	minim.	31.	29.3.	S W. 4 <sup>x</sup> .	
	Dies frigid.	11.	62.	E	S E 2.	} media 55 $\frac{6}{28}$ .
—	—	tepid.	27.	50.	S W b W 3.	

Plures adhuc Variolæ, Morbilli perdurant, ac valde sunt epidemici malique plerumque Moris † gravissima Tussi nempe, Suffocatione, ac peripneumonica Febre haud raro accedentibus—sæpius Alvi Fluxu enormi. Tusses innumeræ, & acres admodum.—Pleuroperipneumoniæ & Pleuritides passim. Colica biliosa sævit plurimum.

## FEBRUARIO.

Per Initia *Februarii* humilis Baroscopii Statio, multaque Pluvia, Ventus ab Occidente flectens ad Austrum, isque sæpe vehemens; Aer interea valde crassus—à 13°  
ad

---

† Tarde admodum sæpe erumpebant Morbilli etiam post sex Dies Febre tamen catarrhali graviter urgente, cum Exacerbatione violentiore sub Noctem; quasi Febris fuisset Hæmitritæa.



ad Finem usque altius multo stetit Barometer—Eurus interdum, Auster sæpe, Zephyrus, subinde ad ipsum Finem Aquilo frigidus.—Insolitus fuit Atmosphæræ Tepor hoc Mense; nullum Gelu nisi ipso 28°.—Florida ubique Tellus est, quasi procedente *Aprili*, volitant Papiliones—Viperæ proserpunt. Anemone Chelidonium minus, Lujula Violæ, Prunus sylvestris efflorescunt undique—Apium Examen 23 apud *Ycalmpton* quod insuetum maxime.

Pluvia  $\frac{''}{1.}$   $\frac{''}{2.}$   $\frac{''}{3.}$   $\frac{'''}{4.}$   $\frac{''}{5.}$  6.  $\frac{'}{7.}$   $\frac{'}{8.}$   $\frac{'}{11.}$  12. 13.  
 14. 21.  $\frac{'}{22.}$  25.  $\frac{'}{27.}$  Grando 3. 5. 27. Nix  
 $\frac{'}{28.}$  Dig. Dec.  
 cum Grandine=3.128.

Fulgura 1. 2. 5. 26. Fulgur & Tonitru 2. 4.

Procella 1 Nocte S 4<sup>x</sup>—3 tota Die W S  
 W 4—9 Nocte W S W 4<sup>x</sup>—22 Nocte S  
 3—27 N W b W 4.

Per-

Permagna *AB.* 15 *H.* 8 & Zona lucidissima albissima *N W b W* 1. 15. 16.—  
8. 56. post.

⌘ Altitud. maxim. 28. 30.2. <i>NN E</i> 3.	} media 29.7 $\frac{3}{8}$ .
———minim. 5. 29.0. <i>W</i> 3 <sup>x</sup> .	
Dies frigid. 28. 67.	} media 51 $\frac{6}{8}$ .
——tepid. 22. 46. <i>S b E</i> 3.	

Morbilli adhuc epidemici ; jam tamen paulo magis sunt benigni, hos autem consequitur sæpe sævissima Tussis ; imo haud raro Peripneumonia—Sæpius vero Alvi Fluxus enormis—Vermes crebro dejiciuntur—Morbi colici plures, Ophthalmia frequens, nec non Rheumatismus : Variolæ paucae, Pleuritides aliquæ.

### MARTIO.

Tepidus quoque fuit & hic Mensis, porro ad Diem vicesimum primum ficcus Aer, interdum pertenuis.—Ventus plerumque Septentrionalis, intervenit Libs aliquando, subinde Corus—à xxi° nunc Libs, nunc Corus, Pluvia sæpe—Tempestas sane multo minus est frigida solito ;  
floreſcit

florescit undique Humus ; quasi exeunte *Aprili* ; vix ullam notavi Glaciem, perraro utique Pruinam.

Pluvia 1. 9. 10. 11.  $\frac{1}{17}$ . 18. 19. 21. 22.  
 $\frac{1}{23}$ .  $\frac{1}{24}$ .  $\frac{1}{25}$ . 26. 28.  $\frac{1}{29}$ . Grando 18. 26. 27.  
 $\frac{1}{30}$  Dig. Dec.  
 $30 = 2.152$ .

Circius vehemens 26—29 Nocte : Fulgura plurima 27°.

§ Altitudo maxim. 15. 30. 3. E N E 1<sup>x</sup>. } media 29.8 $\frac{1}{2}$  $\frac{9}{8}$ .  
 ——— minim. 29. 29. 0. W S W 2. }  
 Dies frigid. 28. 60. N N W 1<sup>x</sup>. } media 50 $\frac{6}{28}$ .  
 ——— tepid. 11. 44. W S W 1. }

Nullæ jam Variolæ, perpauci Morbilli, Ophthalmiæ passim, Pleuritides & Peripneumonix aliquæ, sed raræ—Morbi colici plurimi nec non Catarrhi.

## APRILI.

Durat usque mitissima Tempestas ; Pluviæ tamen satis, nec defuit Sol pulcher subinde : Per Initia Mensis perflavit Vultur-  
 turnus ; à 16° Boreas plerumque, Aër

D

interea



interea tenuis valde, fudumque sæpe Cœlum.

Pluvia  $\frac{1}{1}$ . 3.  $\frac{11}{8}$ .  $\frac{1}{9}$ .  $\frac{1}{10}$ .  $\frac{1}{11}$ .  $\frac{111}{12}$ .  $\frac{11}{13}$ .  $\frac{1}{19}$ .  
 Dig. Dec.  
 $\frac{11}{20}$ . 21. 22.  $\frac{111}{23}$ .  $\frac{11}{26}$ . Grando 18. 24=3.344.

AB. valde lucida 3 media Nocte N N  
 W 1—4 H. 10 p. m. N N W 2—Magna  
 20 H. 9. W N W 1. Gelu 5. N 1. Gla-  
 cies 6. E b N 1. Procella 9. a. m. S  
 E 4x.

§ Altitud. maxim.	30. 30. 1. E NE 1.	} media 29.6 $\frac{10}{28}$ .
———— minim.	8. 29. 3. S SE 3.	
Dies frigid.	5. 60. N 1.	} media 48 $\frac{7}{28}$ .
———— tepid.	21. 42. S 1.	

Nullæ nunc Variolæ—Morbilli adhuc plurimi passim—Ophthalmiæ frequentes, Eruptio pustulosa multorum Caput, atque Faciem infestat. Febres quædam lentæ, & nervosæ—Pleuritides ac Peripneumonix multo rariores solito hoc Anni Tempore.

## M A I O.

Maio incipiente alta Baroscopii Statio—  
 Aër tenuissimus, Apricitas pulchra—Aqui-  
 lo

lo primum, mox Boreas—à 10° Vulturnus  
 pluvius, subsidente Mercurio; à 19° Ven-  
 tus varius, Sol subinde, Pluvia frequens—  
 Blandissima sane fuit Tempestat—Arbores  
 omnes, Frutices atque Pascua florida sunt  
 quam maxime.—Immensa Vis undique  
 Scarabæorum maximorum; Anglice, *May*  
*Bugs, or Cock Chafers.*

Pluvia  $\frac{1}{11}$ .  $\frac{1}{12}$ .  $\frac{111}{14}$ . 15.  $\frac{11}{16}$ . 19.  $\frac{11}{21}$ .  $\frac{1}{22}$ .  $\frac{111}{23}$ .  
 , Dig. Dec.

24. 27. 31. = 2.474.

Fulgur & Tonitru sævissima Vesperi 14.

☿ Altitud. maxim. 2. 30.2. N 1. } media 29.6 $\frac{1}{2}$  $\frac{4}{7}$ .  
 ——— minim. 17. 29.2. S S E 2 }  
 Dies frigid. 3. 46. N 1. } media 35 $\frac{6}{27}$ .  
 ——— calid. 15. 30. S S E 1 $\frac{1}{2}$ . }

Nullæ jam Variolæ, pauci hîc Morbilli—  
 ad Orientem tamen & Occidentem pluri-  
 mi—Ophthalmiæ acerbissimæ permultæ,  
 etiamque haud raro suppurantes—Anginæ  
 & Ulcera Faucium multos infestant: Fe-  
 bris quædam putrida Catarrhalis passim  
 sævo cum Artuum, & Capitis Dolore acce-  
 dente, interdum Phrenitide.

## JUNIO.

Ipso *Junii* Initio gravis Pluvia—ficca  
vero postea Tempestas, & fervida valde—  
Eurus sæpe flavit, sæpius tamen Corus,  
Libs raro, maximi Calores fuere, Euro  
spirante.

Pluvia  $\frac{////}{1}$   $\frac{1}{2}$  6. 7.  $\frac{1}{10}$  12. 13. 15. 23. 24.  
Dig. Dec.  
25. 26 = 1.446.

Fulgur & Tonitru 10. p. m. W S W  
2—21. ad Septentrionem E S E 1. Calor  
enormis à 16 ad 22 inclusive.

☿ Altitud. maxim. 5. 30.0. N 1.	} media 29.6 $\frac{9}{35}$ .
———— minim. 1. 29.2. S S E 1.	
Dies frigid. 2. 44. N W 1 <sup>x</sup> .	} media 28 $\frac{1}{3}$ .
———— fervidiffi. 20. 13. E 1 <sup>x</sup> .	

Morbilli passim frequentes valde—hic Loci  
autem nulli: Peripneumoniæ & Rheumatif-  
mi aliqui; perpauci aliter Morbi: Per  
Danmonium autem Australem Febres mul-  
tæ miliares, maxime circa *Totness*.

JULIO.



## JULIO.

Fuit & hic Mensis ficcus admodum, & fervidus.—Ventus varius, plerumque Occidentalis, vergens ad Arctum: Æstus vehementissimus ab octavo ad decimum quintum Diem, major certe quam hic Loci memini unquam: Humilis erat utplurimum Baroscopii Statio, præcipue flante Austro.

Pluvia  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{5}$  7. 16.  $\frac{11}{17}$   $\frac{1}{19}$  22. 23.  $\frac{11}{25}$  27.  
 " Dig. Dec.  
 28. 31 = 1.552.

Fulgura plurima Nocte 15 S S W 1.—  
 Fulgur & Tonitru cum Grandine 24 W 3.  
 Procella, Fulgur, & Tonitru 31. a. m.  
 S b W 4x. Nebulæ 1. 2. 13. 26.

☿ Altitud. maxim. 8. 29.8. W b N 1. } media 29.4 $\frac{2}{8}$   
 ——— minim. 31. 29.1. S W 4x. }  
 Dies frigid. 28. 40. W N W 1. } media 26.1 $\frac{0}{8}$   
 ——— longe fervidiff. 11. 13. N 1. }

Febres anginosæ pestiferæ cum Maculis rubris, luridis, & Pustulis valde frequentes apud *Causand* & *King sand* & per Viciniam.

Magis sunt vulgares, & pestilentes apud *Liskeard, Fowey, &c.*—Morbilli sparsi sunt adhuc. Febres aliquæ putridæ, cum Exanthematibus. Tussis convulsiva passim inter Pueros, & Coryzæ, Diarrhœa, & Gravedo frequens sub Finem Mensis.

### AUGUSTO.

Per Initia *Augusti* Pluvia multa—Ventus Australis, & sæpe nimbosus—Aër valde crassus, & humidus: à 13° pulchra Tempestas atque calida, Coro ut plurimum spirante ad Finem Subsolano.

Pluvia 1. 2. <sup>11</sup>4. 5. <sup>11</sup>6. 7. 8. 10 <sup>11</sup>11. 12. 18.  
Dig. Dec.  
26. 29. 31. = 1.902.

Procella 4. p. m. S S E 4<sub>x</sub>——5 primo  
Mane S S W 4<sub>x</sub>.

Nebulæ super Aqua sæpissime hoc Mense, & maximæ Rorationes, Malacia frequens—Arbores innumeræ, & omnigenæ quæ spectant ad Meridiem exustæ sunt, cum Fulgure tactæ.

☿ Altitud. maxim. 27. 29.9. W b N 1. } media 29.5 $\frac{1}{2}$ .  
 ——— minim. 2. 29.2. S W b W 2. }  
 Dies frigid. 25. 39. W N W 2. } media 32 $\frac{1}{3}$ .  
 ——— fervid. 18. 26. Malacia. }

Morbilli adhuc in Viciniâ, hic nulli—  
 Febris putrida cum Pustulis, & Maculis  
 rubris (*a scarlet Rash*) passim grassatur—  
 Angina maligna cum Febre Erysipelotèsâ &  
 Ulceribus in Ore pestiferis ; imo interdum  
 gangrænosis, & fœtidis valde sævit in cite-  
 riore *Cornubia*, præcipue apud *Milbrook*,  
*Causand*, & *King sand* inter Pueros imo &  
 haud paucos jugulat. —Per plurimi  
 Canes rabidi.—Muscæ infinitæ omnium  
 Generum jam sunt infensissimæ.

### SEPTEMBRI.

Ineunte *Septembri* gravis Pluvia, Vultur-  
 nus Aër nebulosus; à 6° ad 10 Euris,  
 tunc Corus; à 22° ad Finem usque Bo-  
 reas : Perpulchra Tempestas sæpe hoc  
 Mense; Aër tamen crassus plerumque.

Pluvia



Pluvia  $\frac{1116}{1.}$   $\frac{11}{2.}$  4. 5. 9. 10.  $\frac{1}{12.}$  14. 16.  $\frac{1}{17.}$   
 Dig. Dec.

20 = 1.736.

Magna AB. 11 H. 10 N 1<sup>x</sup>—12 Vesperi W N W 1. Maxima Pruina 16. W N W 1.

⌘ Altitud. maxim. 26. 30.2. N E 1. } media 29.7 $\frac{1}{2}$  $\frac{1}{6}$   
 ——— minim. 9. 29.2. E S E 1. }  
 Dies frigid. 30. 46. N N E 1. } media 33 $\frac{5}{8}$ .  
 ——— calid. 8. 26. E 1. }

Rarissimi Morbi, paucæ jam Cholerae, Morbi colici atque Diarrhoeæ multo minus frequentes quam affolent hâc Tempestate, vix aliqua Febris occurrit.—Salubris fane fuit admodum hic Autumnus; quod utique Benignitati Cœli haud Dubio debetur maxime. Ex Anni Constitutionibus Siccitates sunt pluviosis salubriores, Hippoc. Aph. 15. Sect. 3.

### OCTOBRI.

Venit ab Oriente Ventus toto hoc Mense, vergens plerumque ad Septentrionem, ad Austrum etiam haud raro, hinc longe frigi-



frigidior facta est Tempeſtas, ſub Finem præfertim.

Pluvia 1. 6.  $\frac{''''}{7.}$   $\frac{''}{8.}$  13. 14.  $\frac{'}{17.}$   $\frac{''}{20.}$  — 22.  $\frac{'}{23.}$   
Dig. Dec.

27. 28.  $\frac{''}{30.}$   $\frac{''}{31.}$  Nix 25. Grando 29 = 2.798.

AB. Veſperi 2. N E 1<sup>x</sup> — Magna AB.  
10 H. 9 N E 1. — Levis 11 Veſperi E N E  
1 — 24 Veſperi N E 1 — 25 H. 8. N b  
W 1.

Rigidum Gelu 25. N b W 26 E N E  
2. Procella 27 E b N 4<sub>x</sub>.

☿ Altitud. maxim. 2. 30.1. N E 1<sup>x</sup>. } media 29.5 $\frac{17}{36}$   
—— minim. 7. 29.1. S E 2<sup>x</sup>.  
Dies frigid. 26. 70. E N E 2<sup>x</sup>. } media 54 $\frac{11}{36}$ .  
—— tepid. 1. 42. N 1.

Pleuropneumonix aliquæ, & Morbi  
colici — Tuſſes perplurimæ, pauci aliter  
Morbi.

## NOVEMBRI.

Ineunte *Novembri* Pluvia multa, [Baroſ-  
copii Depreſſio, Atmosphæra maxime  
crassa, Euris velox; a ſexto ad decimum  
E tertium

tertium Cæcias lenis, tunc ab Occidente Ventus; à decimo octavo ad vigesimum sextum Boreas frigidus interveniente, subinde Malacia; sub Finem Auster procellosus, & pluvius, Aër humidissimus.

Pluvia  $\frac{1}{1}$  1.  $\frac{111}{2}$  2.  $\frac{11}{3}$  3.  $\frac{1111}{4}$  4. 5. 6. 14. 15.  $\frac{111}{16}$  16.

17. 19. 24.  $\frac{11}{26}$  26.  $\frac{11}{27}$  27.  $\frac{111}{28}$  28.  $\frac{1}{29}$  29.  $\frac{11}{31}$  31. Grando 4.  
Dig. Dec.

28. 30. Nix 20 = 4.520.

Fulgura 28° Nocte—Vehemens Procella 30 Mane S S W 4<sup>x</sup>.—Maximæ Pruinæ, & Gelu acre à 18 ad 26.

8 Altitud. maxim. 8. 30.2. E NE 2<sup>x</sup>. } media 26 $\frac{9}{24}$ .  
—— minim. 30. 28.6. S S W 4<sup>x</sup>. }  
Dies frigid. 23. 73. N E 2. } media 61 $\frac{3}{4}$ .  
—— tepid. 30. 52. }

Pleuritides ac Peripneumoniæ haud raræ——Tusses plurimæ permolestæ, Tumores & Dolores Faucium atque Dentium permultos vexant——Rheumatismus frequens nec non Diarrhœa torminosa—Per frigidum hunc Autumnum, (suppressa maxime Perspiratione) generatur acris Sanguinis

Sanguinis Colluvies ; quæ varios inducit Corporis Affectus prout hæc nempe vel illa Pars eâ gravatur.

Sub Finem Mensis omnes pene Equi longe lateque gravissima Tussi corripuntur comitante Febre quadam Peripneumonica, & Coryza vehemente sæpe anhelant maxime & Tussi molestissima anguntur—Ex Naribus vero omnes ejiciunt immensam plane Quantitatem Muci valde crassi subflavi deinde viridis interdum sanguinei, Strigmentis immixtis, soporosi fiunt, debilitantur admodum, & Escam omnigenam prorsus respuunt, ad Sudores sunt maxime proclives, tremuntque plurimum—Sanguis horum emissus est densus admodum viscidus & flavus sæpe niger, aut lividus ; quod mali semper est Ominis : Si Tussis supprimitur cito, nimis parumque per Nares reddunt, pereunt brevi ut plurimum pereunt—Qui in Stabulis detenti sunt, pejus se habere videntur quam in Agris—ad unum fere omnes ægrotant etsi haud multi pro Numero moriuntur.



## DECEMBRI.

Ad Diem decimum *Decembris* Libs valde pluviosus; subinde etiam Corus, inde ad vicesimum sextum nunc Vulturnus, nunc Boreas, sæpius tamen Euris, ad Finem Libs, iterum humidissimus. Atmosphæra maxime craffa.

Pluvia  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{3}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{6}$  7. 8. 9. 10.  
 $\frac{1}{17}$   $\frac{1}{24}$   $\frac{1}{25}$   $\frac{1}{26}$   $\frac{1}{27}$   $\frac{1}{28}$   $\frac{1}{29}$   $\frac{1}{30}$   $\frac{1}{31}$  Grando  
 Dig. Dec.  
 1=4.702.

Procella Vesperi & tota Nocte 2 S W  
 4<sup>x</sup> cum Fulgure & Tonitru—3 Mane W  
 b N 4<sub>x</sub> maximæ Pruinæ ac Gelu rigidum  
 à 18 ad 22.

☿ Altitud. maxim. 20. 30. 6. N N E 1<sup>x</sup>  
 ——— minim. 31. 28. 9. S W b W 3<sup>x</sup>. } media 29.5 $\frac{24}{9}$ .  
 Dies frigid. 21. 70. E N E 1.  
 — tepid. 10. 50. S W b W 3<sub>x</sub>. } media 56 $\frac{23}{9}$ .

Apud *Ashburton, Chudleigh, Newton, &c.*  
 Febres multæ putridæ, lentæ sæpe cum,  
 sæpe sine Exanthematibus, nec non Morbilli  
 maligni.



maligni. Febres porro Dysentericæ apud *Ashburton*, & per Viciniam——Anginæ quædam sævæ passim, quædam Peripneumoniæ atque Pleuritides; Tusses & Coryzæ permultos infestant,—Colica frequens. Evanuit jam penitus Morbus inter Equos.

Tota Pluviæ Quantitas hoc Anno  
Dig.Dec.  
MDCCL=3.192.

Finis Anni 1750.

### JANUARIO.

Diem ad usque vicesimum primum *Januarii* Aër fuit quam maxime humidus; ineunte Mense multa Pluvia; nunc Libs nunc Corus ad xviii; à xxi° Ventus Aquilonius vergens ad Orientem plerumque unde rigidum sæpe Gelu & Frigus acre, immensæ subinde Pruinæ, Atmosphæra autem ficcior longe.

Pluvia

Pluvia  $\frac{1}{1}$   $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{5}$  6. 7.  $\frac{1}{8}$   $\frac{1}{11}$  12. 14.  
 17. 18.  $\frac{1}{19}$  20. 25.  $\frac{1}{26}$  30. Grando 7. 13.  
 Dig. Dec.

15. Nix 15. 16. 27. 28. 29 = 3.433.

Procella 3. Mane S W  $4^x$  — 16 Noctu  
 S W  $4^x$  — 17 Mane S b W  $4^x$  Arcius vehe-  
 mens 25 Nocte : asperrimum Gelu 28.

$\frac{3}{8}$  Altitud. maxim. 23. 30.2. E N E  $3^x$ . } media 29.5.  
 ———— minim. 1. 28.8. S S E  $4^x$ . }  
 Dies frigid. 28. 72. N b W 2. } media  $60\frac{2}{9}$ .  
 ——— tepid. 1. 58.

Pleuritides & Rheumatismi multi,  
 Tusses & Dentium Dolores plurimi, Co-  
 lica passim: Febres lentæ putridæ grassan-  
 tur adhuc prope *Ashburton*, *Newton*, &c.  
 Pleuroperipneumonix, ac Peripneumo-  
 nix frequentes.

## FEBRUARIO.

Insequitur *Februarius* frigidus, præser-  
 tim per Mensis Initia, Borea perflante<sup>x</sup> ab  
 octavo; tamen ad Finem usque aut Libs  
 aut Corus gelidus; pluviosa utique &  
 procellosa

procellosa Tempestas plerumque ab undecimo, Atmosphæra porro crassa valde.

\* Acre admodum Gelu à Die secundo ad octavum.

Pluvia  $\frac{''}{11}$ .  $\frac{'}{12}$ . 13. 14. 17. 19.  $\frac{''}{20}$ . 21.  $\frac{'}{23}$ .

$\frac{'''}{24}$ .  $\frac{'}{26}$ .  $\frac{'}{27}$ . 28. Nix 4. Grando 13. 14.

Dig. Dec.

20. 21. 26 = 2.516.

Procella 21. Nocte N N W 4—24 ab H. 10 a. m. ad 4 p. m. S W 4—25 Nocte W S W 4<sub>x</sub>—26 Mane W b S 4—27 S W b W 4. Fulgur & Tonitru 24 Nocte—26 Nocte.

Arcus lucidus permagnus per Zodiacum 8 Hora 7 $\frac{1}{2}$  p. m.

‡ Altitud. maxim. 7. 30.1. E N E 1. } media 29.6  $\frac{10}{28}$   
 ——— minim. 26. 29.0. W b S 4.

Dies frigid. 3. 72. E N E 3. } media 60.  
 ——— tepid. 23. 52. W S W 1<sub>x</sub>.

Pleuritides ac Peripneumoniæ valde sunt frequentes—Rheumatismi multi, Anginæ aliquæ, Tusses per plurimæ vehementes, nec non Coryzæ cum Sternutamentis fere perpetuis,



petuis, acribus, & molestissimis—Colica biliosa passim—Sanguis jam extractus est plerumque densus admodum, & viscidus.

### MARTIO.

Pluvius fuit admodum, & procellosus hic Mensis—Libs perflavit sæpissime, interdum etiam Argestes, Atmosphæra crassa valde, & subinde gelida; Gelu tamen vix aliquid—Statio Mercurii plerumque humilis.

Pluvia	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.
	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>
	12.	14.	15.	17.	18.	21.	25.	26.	27.
									28—30.
									Dig. Dec.

Grando 1. 5. 15. 17. 19. 30=5.590.

Procella 4 p. m. S W b W 4<sub>x</sub>—5 Mane W b N 4—6 p. m. S W b S 4—13 Nocte S W 4—14 Nocte—15 Nocte W N W 4—17 tota Nocte S S W 4<sup>x</sup>—18 Mane W 4—25 Nocte W 4<sub>x</sub>—26 Mane N W b W 4—29 p. m. W 4<sub>x</sub>.

Fulgura



Fulgura Nocte 4. Fulgur & Tonitru  
vehemens 5. a. m. Fulgur & Tonitru 6  
p. m.—15 Vesperis.

$\frac{1}{2}$  Altitud. maxim. 23. 30. 2. E N E 1<sup>\*</sup>. } media 29.4 $\frac{1}{3}$  $\frac{4}{5}$   
 ——— minim. 4. 29. 0. }  
 Dies frigid. 19. 60. N W 1. } media 52. $\frac{2}{3}$  $\frac{4}{5}$ .  
 ——— tepid.. 28. 48. W S W 2. }

Tusses, Coryzæ, Raucedines perpluri-  
mæ cum magno Faucium Tumore, atque  
acerbo Dentium Dolore——Rheumatismi  
multi gravissimi: Pleuritides nec non  
Peripneumonix valde frequentes.

#### APRILI.

Decidit quoque Pluvia haud exigua  
hoc Mense; pulchra tamen aliquando lu-  
tervenit Apricitas, spirante tunc Vento ab  
Oriente—Cæterum Septentrio magis quam  
Auster prævaluit: Aër fuit sæpe tenuis,  
interdum frigidus, præcipue *Aprilis* Initio.

Pluvia  $\frac{1}{1}$  1. 2. 5. 6. 10. 11. 12. 14.  $\frac{11}{15}$  15. 20.  
 21. 22.  $\frac{23}{24}$  23. 24. 28.  $\frac{29}{1}$  29. Grando 1. 5. Nix  
 Dig. Dec.  
 multa 4=3.376.

F

Fulgur

Fulgur & Tonitru 1. p. m. Procella  
27. E b N 1.

Ampliffimus Halo circa Lunam 23 H.  
9. p. m.

8	Altitud. maxim.	8.	29.8.	E N E	1.	} media 29.5.
—	minim.	23.	29.2.	S S W	1.	
Dies	frigid.	5.	62.	N N E	2 <sub>x</sub>	} media 48 $\frac{2}{7}$ .
—	tepid.	29.	40.	E	1.	

Pleuritides ac Peripneumoniæ & veræ,  
& spuria valde sunt frequentes undique,  
haud largam tamen Sanguinis Missionem  
facile ferunt; etsi Cruor est sæpe viscidus  
valde: Rheumatismi plurimos torquent.  
Tusses, Coryzæ, Parotidum & Maxilla-  
rum Tumores, Dentiumque Dolores ubi-  
que sæviunt maxime. Febres intermit-  
tentes aliquæ, Colica biliosa passim & mul-  
tæ Ophthalmiæ. Juniores perplurimi Pus-  
tulis aquosis scabiosis per totum Corpus  
infestantur.

### M A I O.

Prior *Maii* Pars fuit pluvia atque per-  
frigida, posterior sicca, jucunda, calida;  
ineunte Mense Ventus inconstans; à de-  
cimo

cimo nono ad ipsum Finem ab Oriente aut Sepentrione quod Atmosphæram siccat vit plurimum.

Pluvia  $\frac{1}{1}$   $\frac{2}{2}$  4.  $\frac{1}{5}$   $\frac{2}{7}$  8.  $\frac{1}{10}$   $\frac{2}{11}$   $\frac{1}{12}$ .

Dig. Dec.

13.  $\frac{2}{15}$  16. 27. Grando 5. 6=2. 570.

Procella 2. p. m. S W  $4_x$ —5 N W b W 4—12 E S E  $4_x$ . Gelu & maximæ Pruinæ 5. 7.

§ Altitud. maxim. 20. 30. 1. E N E 1. } media 29.  $6\frac{20}{28}$ .  
 ——— minim. 3. 29. 1. W b N  $2_x$ . }  
 Dies frigid. 7. 56. S E 3. }  
 ——— calid. 25. 26. N E b E  $2_x$ . } media  $40\frac{2}{28}$ .

Pleuritides & Peripneumonix passim, Colicæ & Rheumatismi multi, ac tabidi plures : Tussis & Asthma frequens ; Coryzæ permultæ cum Faucium Tumore ; præsertim Mensis Initio. Variolæ jam aliquæ huc advectæ à Militibus de Regiment de *Conway*.

## JUNIO.

Ineunte *Junio* valde calida Tempestas, Euro perflante : a 12 ad 20 venit ab Occi-

F 2

dente



dente Ventus, tunc recurrit Eurus multa cum Pluvia—Sub Finem Auster, Aër inde longe humidior.

Pluvia 6. 7.  $\frac{11}{8}$ .  $\frac{11}{15}$ .  $\frac{1}{16}$ . 18.  $\frac{1}{19}$ .  $\frac{11}{22}$ .  $\frac{1}{23}$ .  
 Dig. Dec.  
 $\frac{11}{25}$ .  $\frac{11}{26}$ .  $\frac{11}{27}$ . 28.  $\frac{11}{29}$ . 30 = 3.114.

Procella 6 p. m. E S E 4—7 Mane E S E 4<sub>x</sub>—22 p. m. & ad mediam Noctem E 4.

Fulgura plurima sæpe cum Tonitru 5 Nocte—6 Fulgura perpetua Nocte & Tonitru frequens—7 Fulgura perpetua lucidissima, at pallidissima p. m. & tota Nocte mugiente subinde Tonitru—Fulgura multa 9 Nocte, Tonitru è longinquo.

Pulcherrimus Cœli Color puniceus 19 Vesperis W S W 1<sup>x</sup>.

8	Altitud. maxim.	3. 30.0.	Malaci	} media 29.5 $\frac{1}{2}$ .
—	minim.	29. 29.1.	S 3.	
Dies	frigid.	23. 43.	E 3.	} media 29. $\frac{2}{8}$ .
—	fervid.	6. 17.	E S E 4 <sub>x</sub> .	

Variolæ frequentes in Oppido, Febres pustulosæ passim—Peripneumonix nothæ aliquæ, Tussis & Faucium Tumores plurimi: Phthisi pulmonari multi laborant,

JULIO.



## JULIO.

Sequitur jam *Julius* pluviosus, & majore ex Parte algidus; prævaluit hoc Mense Libs, haud raro tamen intervenit Corus, interdum Favonius; Atmosphæra plerumque crassa & humida.

Pluvia  $\frac{////}{1.}$  2. 3.  $\frac{//}{4.}$  5. 6. 10—12.  $\frac{.}{15.}$   $\frac{//}{16.}$   
 $\frac{.}{17.}$  18.  $\frac{////}{20.}$   $\frac{//}{21.}$   $\frac{////}{23.}$  24. 25.  $\frac{////}{26.}$  29.—31.  
 Dig. Dec.  
 =4.996.

Densissima, foetida Nebula toto Die 21.  
 Maxima Diluvia sub Finem Mensis undique—Fontes omnes, & Rivuli exundant maxime.—Fructus omnes horæi fatui sunt prorsus, & crudissimi—rarissime Papilionem imo vix Muscam vides—Multi Canes rabidi discurrunt. Cicadæ silent omnino.

8 Altitudo maxim. 9. 29.8. N N W 1. } media 29.4 $\frac{2}{3}$ .  
 ——— minim. 26. 29.0. S S E 3. }  
 Dies frigid. 1. 39. W N W 2<sup>x</sup>. } media 31 $\frac{1}{3}$ .  
 ——— calid. 9. 25. }

Variolæ

Variolæ passim hic & jam per Viciniam : Febres miliares, putridæ, lentæ aliquæ hic, longe plures per Oras Orientales & Australes *Devoniæ* imo & haud raro lethales. Pleuripneumonix nonnullæ—Morbi colici frequentes & acerbi. Ora apthosa jam fere epidemica: Quandoquidem tam infausta Pluvia frigidaque fuit Tempestas per pauca Funera videmus—Omnes tamen maximo Virium Languore laborant.—Credo equidem quod præsens Cœli Salubritas haud parum nimboris crebrisque Ventis debetur; qui Atmosphæram tam frequenter purgârunt.

### AUGUSTO.

Submissum fuit Baroscopium *Augusti* Initio; Libs plerumque, Aër crassus: à 12 ad 15 Corus. Maximæ Rorationes 7—inde Libs rursus ad 21; post Aquilo, dein Eurus, ad Finem Corus: Nebulæ sæpe hoc Mense—Sub Finem flante Euro Aër valde tenuis—Ros plurimus.

Pluvia

Pluvia  $\frac{''}{1.}$   $\frac{'}{3.}$  4. 5.  $\frac{'}{7.}$  9.  $\frac{'}{10.}$   $\frac{'}{16.}$  18.  
Dig. Dec.

19.  $\frac{'}{20.}$  21. 28. 30 = 1.434.

Magna AB. 8. W N W 1<sup>x</sup>, Pruina  
29.

§ Altitud. maxim. 29. 30.1. N N W 1<sup>x</sup>. } media 29.5 $\frac{2}{3}$ .  
—— minim. 3. 29.1. S S W 3.

Dies frigid. 29. 44. ——— } media 32 $\frac{2}{30}$ .  
—— calid. 24. 26. Malacia.

Variolæ modo sunt frequentes, Morbi colici plurimi multo cum Angore Ventriculi, ac Vomitione.—Haud pauci Apoplexiâ perculsi sunt. Morbi Hypochondriaci & Hysterici undique.—Canes rabidi passim. Aviculæ perplurimæ pereunt inter Plumas exeundas. Vix vides Papilionem—raro audis Cicadam, adeo tristis fuit Tempestas Mensis Initio.

### SEPTEMBRI.

Parum fuit constans hoc Mense, ventus, ab occidente tamen plerumque Barometer; nec multum elatus nec valde depressus—Medio Septembri Apricitas, Pluvia



via parca. Sub Finem perplurimæ densæ  
Nebulæ—Maxima Pruina atque Glacies  
22. 26. 27. 30.

Totum Cælum etsi nubilum lumino-  
sum Noctu 7 & 8 ; unde nescio.

Pluvia  $\frac{''}{1}$ .  $\frac{'}{5}$ .  $\frac{''}{6}$ .  $\frac{'}{7}$ .  $\frac{''}{8}$ . 9. 11. 12. 15  $\frac{'}{20}$ .  
Dig. Dec.  
21.  $\frac{'}{24}$ .  $\frac{'}{27}$ .  $\frac{''}{28}$ . 29 = 2.306.

Max. Barom. Altit. 13. 30.0. WNW 1<sup>x</sup>. } media 29.6  $\frac{3}{8}$ .  
Minim. ————— 7. 29.1. S 2.  
Dies frigid. 27. 54. NE 1. } media 41  $\frac{4}{8}$ .  
— calid. 5. 35. E S E 2.

Variolæ passim, jamque Indolis peioris :  
Infantes & juniores innumeri Pustulis, Ti-  
nea, & Achoribus vexantur. Icterus valde  
frequens. Febres aliquæ putridæ, Pustu-  
lis urentibus aquosis comitatæ—Hæmiple-  
giæ aliquæ, & Paralyfes. Morbi Hypo-  
chondriaci plures. Morbus Colicus cum  
magno, & pertinaci Stomachi Angore  
plures torquet ; horum Alvus est plerum-  
que valde astricta ; biliosa multa, ac por-  
racea vomunt.

Octo-

## OCTOBRI.

Venit ab Oriente Ventus toto hoc Mense, nunc ad Septentrionem nunc ad Austrum declinans, isque sæpe velox valde — Aër fuit plerumque ficcus haud raro gelidus admodum, ad Finem acre Gelu.

Pluvia  $\frac{''''}{3.}$   $\frac{''}{4.}$   $\frac{''}{5.}$  6.  $\frac{''}{7.}$   $\frac{''}{8.}$  9. 12. 23. 24.  
 Dig. Dec.  
 $\frac{''}{26.}$   $\frac{''''}{27.}$  30. = 3.060.

Procella 8 Noctu E  $4_x$  — 13 toto Die E  
 b S  $4_x$  — 14 p. m. E b S  $4_x$  levis AB. 12  
 H. 8. E N E 2.

☿ Altitud. maxim. 18. 30.0. E  $3^x$ .  
 ——— minim. 26. 29.0. E S E  $2^x$ . } media 29.7.  
 Dies frigid. 30. 64. N  $1^x$ .  
 — tepid. 2. 40. E S E  $1^x$ . } media  $49\frac{13}{30}$ .

Variolæ passim; Pleuritides & Peripneumoniarum aliquæ, Tussæ Asthmaticæ laboriosæ frequentes — Rheumatismi multi Colicæ biliosæ, haud raro, nec Icterus.

Morbus phreneticus inter Equos — Horrent primo, & tremunt plurimum; mox

G

tristes

tristes fiunt ac somnolenti: Dein phrenetici imo furiosi quasi pauloque post occidunt.

### NOVEMBRI.

Ad Diem *Novembris* undecimum permanfit Ventus Orientalis, ad Finem etiam recurrit; intermedio autem Tempore Libs, aut Corus—Atmosphæra porro sæpe humidus valde, subsidente tandem plurimum Baroscopio.

Pluvia 1.  $\frac{1}{11}$ .  $\frac{2}{12}$ .  $\frac{1}{13}$ . 14.  $\frac{2}{15}$ .  $\frac{2}{16}$ . 17.  $\frac{2}{18}$ . 19.  
 $\frac{3}{20}$ .  $\frac{2}{21}$ .  $\frac{2}{22}$ .  $\frac{3}{23}$ . 24. Nix 1. Grando 20.  
 Dig. Dec.  
 $25 = 3.510$ .

AB. levis 7. H. 9. E b N 1—Magna  
 30 Vesperi E N E 2.

Gelu acre Mensis Initio, & ad Finem.

Procella 16. p. m. S W b S  $4_x$ —20 p.  
 m. S S W 4—21 Mane S W b W  $4_x$ —22  
 p. m. S W b W  $4_x$ —Fluctus immensi, &  
 Maris Æstus maxime inundans 21—Fulgur  
 & To-



1751.] & *Morbis Epidemicis.* 51

& Tonitru sævissima 21 ab H. 3. p. m. ad  
6<sup>m</sup> Barometro tunc subfidente ad 28. 7.—  
Permagnus Æstus 24 Vesperis.

§ Altitud. maxim. 5. 30. 4. N E 1.  
 ————minim. 20. 21. 28. 7. SW b W 4 } media 29. 7 $\frac{1}{2}$ .  
 Dies frigid. 29. 67. E N E 2<sup>x</sup>.  
 ————tepid. 15. 49. W S W 2. } media 57.

Variolæ multæ, quædam mali admodum Moris, sæpe crudo tantum Ichore scatent, sæpe nigræ, sessiles, ac Petechiis lividis interstinctæ—Tusses Destillationes Faucium Tumores, Dentiumque Dolores permultos laceffunt. Rheumatismi, Pleuritides, & Peripneumonix aliquæ. Tormina Ventris haud paucos cruciant, quosdam Dysenteria, Asthma gravis plures.—Anginosa quædam Febris cum Erysipelate & Pustulis plurimis passim sub Finem Mensis grassatur.

## DECEMBRI.

Per Decembris Initia Aër perfrigidus, Ventus Aquilonius, rigidum Gelu, alta Barometri Statio—à 15 ad 21 Vulturnus  
G 2 cadente

cadente Mercurio—Ad Finem Boreas Nix  
& acre Gelu.

Pluvia 1. 3. 5. 12.  $\overline{15}$ . 16. 17. 18.  $\overline{19}$ .  $\overline{20}$ .  
21.  $\overline{23}$ .  $\overline{25}$ . 28. Nix 1. 13. 29. 30. 31=  
Dig. Dec.  
2.406.

Immensi Fluctus (*Boars*) à 18 ad 21.  
Amplissimus Halo circa Lunam H. 9. p.  
m. 20 S E 2<sup>x</sup>.

☿ Altitud. maxim.	5. 30. 2. N 1.	} media 29.7 $\frac{16}{36}$ .
———— minim.	21. 29. 1. S b W 3 <sup>x</sup> .	
Dies frigid.	7. 72. N N E 1.	} media 62 $\frac{1}{2}$ .
———— tepid.	21. 52.	

Variolæ hic jam epidemicæ, imo & inter juniores frequenter exitiales: Quippe sæpe crudæ, interdum petechiales: Plurimi Rheumatismi acerbis atque difficiles—aliqui inflammatorii ac difficiles quidem Scorbutici & pertinaces admodum.—Tussis & Asthma valde frequens, quosdam cruciat vehementer: Permultæ Destillationes cum Faucium & Tonsillarum Tumore molestissimæ. Tormina biliosa pestifera perplu-

perplurima. Anginæ inflammatoriæ plures premunt, malignæ diræ quosdam cum Pustulis puniceis minimis, sed innumeris.

Tota Pluviæ Quantitas Anno MDCCLI  
Dig. Dec.  
fuit = 38.311.

Finis Anni 1751.

### JANUARIO.

Incipiente Anno læta Rerum Facies, Apricitas perpulchra, rigidum Gelu, immensæ Pruinæ, Boreas ficcus, incepit autem liquefcere Gelu 7°.—Mox irruit Auf-  
ter, decidunt Pluviæ; recurrit Boreas 16°  
Nubesque discutit; à 18 pluvius Vulturnus,  
23 & 24 Boreas iterum, dein rursus Vul-  
turnus, ad Finem Corus.

Pluvia	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	18.
	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>
	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>
	19.	20.	21.	22.	25.	27.	28.	29.	31
	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>

Dig. Dec.  
= 4.042.

Procella



Procella 13 a. m. S  $4_x$ —14 Mane 28.  
 7 S W b S 4—19 a. m. S b W 4—22 a.  
 m. S S E 4. Maximi Maris Æstus ac  
 inundantes à 19 ad 23.

$\frac{3}{4}$  Altitud. maxim. 4. 30.4. E N E 2. } media 29.5 $\frac{2}{5}$ .  
 ——— minim. 14. 28.7. S W b S 4. }  
 Dies frigid. 4. 70. }  
 — tepid. 13. 53. S  $4_x$ . } media 60 $\frac{1}{2}$  $\frac{2}{9}$ .

Variolæ usque epidemicæ, sæpe crudæ,  
 & prave maturantes, nonnunquam Pe-  
 techiis maculatæ. Anginæ mucosæ, at-  
 que Faucium Tumores valde frequentes.  
 Angina ulcerosa imo, & gangrænosa  
 quosdam corripit——Peripneumonix ac  
 Pleuroperipneumonix passim——Tusses inter  
 omnes, sæpe vehementes sæpe tabificæ.  
 Plurimi Rheumatismi valde acerbi.

## FEBRUARIO.

Per Initia *Februarii* Ventus Aquilonius,  
 Aër perfrigidus, Sol sæpe—Ab 8° Ventus  
 inconstans valde, medio Mense Pluvia  
 multa, & Initio & Fine præalta Baros-  
 copii Statio, Atmosphæra sicca, maximæ  
 Pruinæ.

Pluvia

Pluvia 4.  $\frac{1}{8}$ .  $\frac{1}{9}$ .  $\frac{1}{10}$ .  $\frac{1}{11}$ .  $\frac{1}{13}$ .  $\frac{1}{15}$ .  $\frac{1}{16}$ .  $\frac{1}{17}$ .  $\frac{1}{18}$ .  
 Dig. Dec.  
 19. 21.  $\frac{1}{24}$ . 26. Nix 8. Grando 27 = 2.910.

☿ Altitud. maxim. 28. 30.6. N 1.  
 ——— minim. 11. 29.2. W S W 2. } media 29.8  $\frac{22}{8}$ .  
 Dies frigid. 7. 71. E N E 2<sup>x</sup>. }  
 ——— tepid. 26. 52. S 3<sup>x</sup>. } media 53  $\frac{21}{8}$ .

Variolæ epidemicæ in hoc Oppido ; raræ autem per Viciniam—Pleuritides & Peripneumonix plures, Rheumatismus torquet plurimos : Angina mucosa multos, multos etiam inflammatoria cruciat, quædam porro Anginæ malignæ grassantur. Morbus Colicus passim, & Icterus. Tusses & Faucium Tumores, Dentiumque Dolores valde frequentes.

### MARTIO.

Ineunte & exeunte *Martio* Pluviæ parum ; Aër ficcus Gelu interdum & magnæ Pruinæ Ventus ab Oriente ; medio Mense Corus plerumque Pluvia frequens.

Pluvia

Pluvia  $\frac{1}{2}$ . 4.  $\frac{1}{9}$ . 12.  $\frac{1}{13}$ . 14. 15.  $\frac{1}{17}$ . 18.

19. 22. 23. 24. Grando 13. 14. 15. 18. 27.  
Dig. Dec.

Nix 20. 25 = 1.510.

Procella 13. a. m. S W b S 4—16 a.  
m. N W 4—24 N W 4<sub>x</sub>—30 E S E 4<sub>x</sub>.  
Tonitru Mane 24. 15° vehemens Tem-  
pestas apud *Londin*, &c. usque ad *Dover*  
hic N W 3<sup>x</sup>.

§ Altitudo maxim.	7. 30.4. E 2.	} media 29.8 $\frac{1}{15}$ .
—— minim.	13. 29.2.	
Dies frigid.	8. 64. E N E 1.	} media 56.
—— tepid.	11. 48. W N W 1 <sup>x</sup> .	

Variolæ frequentes, aliqui multo pau-  
ciores: Anginæ, Pleuritides & Peripneu-  
monia permultæ; Rheumatismus cruci-  
ans passim. Tussēs vehementes undique.  
Asthma gravissimum plurimos opprimit.  
Morbi Colici & aliqui Ictrici.

#### APRILI.

Lætissima sæpe Tempestas hoc Mense,  
& per Initia & per Medium Aprilis, flan-



te ut plurimum Borea ficco; ab 11 autem ad 14 multa decidit Pluvia, post 20 Corus prævaluit.

Pluvia  $\frac{1}{11}$ .  $\frac{1}{12}$ .  $\frac{1}{13}$ .  $\frac{1}{14}$ .  $\frac{1}{20}$ .  $\frac{1}{21}$ .  $\frac{1}{22}$ .  $\frac{1}{23}$ .  $\frac{1}{24}$ .  
 Dig. Dec.  
 25. 27. 28. 30 = 2.724.

♀ Altitud. maxim. 16. 30.2. E N E 1<sup>x</sup>.  
 ——— minim. 25. 29.2. W N W 3<sup>x</sup>. } media 29.7<sup>2</sup>/<sub>36</sub>.  
 Dies frigid. 1. 62. S N E 2.  
 ——— tepid. 10. 38. S W b W 1. } media 47<sup>4</sup>/<sub>38</sub>.

Crebræ adhuc Variolæ hic & passim;  
imo & interdum lethales——Icterus fre-  
quens, Hydrope plures laborant—Rheu-  
matismi, Pleuritides, & Peripneumonix  
plurimæ——Permuli atque etiam adulti  
Vermibus scatent—Tusses & Faucium  
Tumores undique.

MAIO.

Varius fuit hoc Mense Ventus, sæpe  
Africus, sæpe Corus, Eurus subinde—Prior  
*Maii* Pars tempestitiva fatis, posterior plu-  
viosa valde—Sicca Medio, atque tenuis  
Atmosphæra, Flatus ab Oriente.

HI

# Pluvia

Pluvia 1.  $\frac{1}{5}$ .  $\frac{1}{6}$ .  $\frac{1}{7}$ .  $\frac{1}{8}$ .  $\frac{1}{20}$ . 21. 22. 24. 25.  
 $\frac{1}{26}$ . 27. 28.  $\frac{1}{29}$ .  $\frac{1}{30}$ .  $\frac{1}{31}$  = 3.328. Dig. Dec.

Procella 1 S W b W  $4_x$ —31 p. m. S S  
 W 4 Nebula foetida 19 S S W 2 multa  
 Fulgura Nocte 25 S S E 2.

☿ Altitud. maxim. 12. 29.9. E 2. } media 29.5 $\frac{1}{3}$ .  
 ——— minim. 21. 29.1. S S W 3. }  
 Dies frigid. 3. 49. E 2. } media 37 $\frac{3}{8}$ .  
 ——— calid. 19. 28. S S W 2. }

Plurimæ etiamnum Variolæ--Multi Rheu-  
 matismo laborant—Haud pauci Pleuri-  
 tide ac Peripneumoniâ, Tusses frequentes,  
 & graves Asthmatis Paroxyfmi—Plures  
 Phthifi Pulmonum contabescunt.

## JUNIO.

Ad Diem *Junii* decimum quintum Plu-  
 viæ parum—Sol sæpe calidus, Ventus in-  
 constans, Auster ut plurimum—Ab isto  
 autem Tempore multa Pluvia, Atmos-  
 phæra craffa valde, & humida, atque eti-  
 am plerumque frigida: Baroscopii Statio  
 humilis.

Pluvia.

Pluvia  $\frac{1}{1}$ . 2.  $\frac{1}{3}$ . 9.  $\frac{1}{10}$ .  $\frac{1}{16}$ . 17.  $\frac{1}{18}$ . 19.  
 $\frac{1}{20}$ . 21. 22. 23. 24.  $\frac{1}{26}$ .  $\frac{1}{29}$ . 30 = 3.286.  
 Dig. Dec.

Procella 4 primo Mane W S W  $4_x$ —17  
 Vesperi & Nocte S S W  $4_x$ —18 Mane &  
 ad Meridiem fere S S W 4. Maxima Di-  
 luvia medio Mense.

§ Altitud. maxim. 9. 29. 9. N N W  $1^x$ . } media  $29.4\frac{10}{24}$ .  
 ——— minim. 18. 29. 0. S S W  $4$ . }  
 Dies frigid. 20. 40. N N W 1. } media  $33\frac{18}{24}$ .  
 ——— calid. 15. 26. S b W  $2_x$ . }

Variolæ epidemicæ frequenter, nigræ,  
 parvæ, malignæ cum Petechiis: Sæpe cru-  
 dæ admodum, & aquosæ prorsus—Mini-  
 me maturantes—Haud pauci Ictero labo-  
 rant & Hydrope; multi Colicis Doloribus:  
 Passim Asthma sævissimum—Rheumatif-  
 mus atque Arthritis multo crebrior solito  
 hâc Anni Tempestate. Febris anginosa  
 pestiferi Moris sævit plurimum, præcipue  
 sub Mensis Finem hoc in Oppido, nec  
 non apud *the Dock* & in citeriore *Cornubiâ*  
 —Fauces plerumque fœdis & fœtidis Ul-  
 ceribus eroduntur, tota Cuticula ferè Ex-



anthematibus prærubris turpatur tandem-  
que tota desquamatur; Febris adest  
haud levis Initio & majore ex Parte Deli-  
rium, præcipue adventante Nocte cum  
exacerbatur semper.—Pertristis sane ac  
pluviosa Tempestas magnam infert omni-  
bus & Animi & Corporis Dejectionem.

### JULIO.

Frigidus quoque & pluvius fuit hic  
Mensis; Aërque sæpe crassissimus, sub  
*Julii* Finem Pluvia gravissima inundans  
omnia. Auster prævaluit à 18 tamen ad  
24 Aquilo perpetuus.

Pluvia 1. 3. 4.  $\frac{''}{5}$ .  $\frac{'}{6}$ . 9. 10. 14. 15  $\frac{'}{16}$ . 17.  
Dig. Dec.  
23.  $\frac{''''}{24}$ .  $\frac{'''}{25}$ .  $\frac{''}{26}$ .  $\frac{'}{27}$ . 29. 30 = 2.864.

Fulgur & Tonitru sævum 25 Nocte.

§ Altitud. maxim. 19. 29.9. N N E 1. } media 29.5  $\frac{10}{25}$ .  
——— minim. 24. 29.0. S 3<sup>x</sup>.  
Dies frigid. 25. 40. S W b W 2. } media 32  $\frac{20}{25}$ .  
——— calid. 2. 25. N N W 1<sup>x</sup>.

Variolæ

Variolæ ubique maxime epidemicæ, æque plerumque crudæ admodum, aut parvæ, nigræ, & seffiles sunt, sane haud parum funestæ, acri fere diffluunt Humore, & minime cocto, Sputa tamen sunt largissima, atque sæva sæpe oriuntur Fau-  
cium Ulcera.

Febris anginosa qualem descripsi† 1734 passim vagatur, nec non Angina maligna, sub utriusque Finem maximus est Pruritus per totum Corpus; imo sæpe intolerabilis tandemque omnis desquamatur Cuticula; imo & in junioribus ipsæ interdum decidunt Ungues.

Febres Catarrhales ac Rheumatismi frequentes: Tusses vehementes per plurimos vexant, permultos Asthma aut Arthritis, haud paucos Tumores Colli, Fau-  
cium, Maxillarum etiam, ubi Angina prorsus deest.

In omni Febre quam maxima est ad Exanthemata ac Sudores Dispositio, raroque Fauces non aliquo Modo gravantur — Perraro jam extrahitur glutinosus San-  
guis

---

† Vide Vol. I. Men. April.

guis—Urina est plerumque cruda, quasi ineffect tantillulum Lactis, aut subviridis præcipue Febrium Initio, sed quod miror, sæpe Dysuriam parit.

### AUGUSTO.

Durat usque pluvia Tempestas, licet enim per Mensis Initia & calida fuit valde† & aprica satis—Post decimum tamen continuæ ferme decidere Pluviæ, Austro plerumque aut Cauro flante; unde frigidus, & valde humidus Aër.

	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	
Pluvia	1.	11.	12.	13.	14.	16.	17.	18. 19.
								Dig. Dec.
21.	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>	<u>  </u>			
25.	26.	27.	28.	30.	31=3.	32.		

Nebula densissima 10 N W 1<sup>x</sup>—29. 30.  
31. Fulgura perplurima 11 Nocte—25  
primo Mane nec non 25.—Quam latissi-

† Innumeræ lucidissimæ prærubræ Nubeculæ 30 Horâ  
10<sup>a</sup> p. m. ab Hora autem undecimâ Nocte ad 2<sup>m</sup> matutinam  
31<sup>a</sup>. AB. valde luminosa N W 1<sup>x</sup>.



mus Halo circa Lunam 12 ab H. 9. ad  
 11 Noctis Grando vehemens admodum.  
 Grando sævissima 12 Horá 11<sup>a</sup> & 12<sup>a</sup>  
 a. m. W N W 1<sup>x</sup>.

Altitud. maxim. 18. 29.9. Malacia.	} media 29.5.
————— minim. 25. 29.0. S S E 3 <sup>x</sup> .	
Dies frigid. 26. 44. N W b W 3 <sup>x</sup> .	} media 30 <sup>22</sup> / <sub>9</sub> .
————— fervid. 9. 17. E N E 1.	

Maxime adhuc grassantur Variolæ, crudæ sunt plerumque, & ichorosæ; haud raro autem atræ, sessiles, parvæ, pestiferæ, accedente sæpe per Febris Initia præ-larga navium Hæmorrhagia, præcipue vero Mensis Initio, raræ autem fuere Petechiæ.

Febris anginosa, pustulosa, erysipelato-  
 tosa sævit plurimum—Multum porro An-  
 gina maligna—Choleræ plurimæ passim—  
 Torquet etiam per plurimos Arthritis &  
 Rheumatismus—Tusses & Faucium Tu-  
 mores innumeri—Febres aliquæ putridæ,  
 lentæ, remittentes sine Pustulis aut Aphthis.  
 Contristantur maxime omnium pene Ani-  
 mantium Genera, infauissima Messis—  
 Fructus

Fructus fatui & crudi prorsus, corruptum  
Squalore humido est Frumentum.

# SEPTEMBRI.

Nulla Pluvia per sex ultimos *Septembris*  
Dies; sed Apricitas pulchra, Euro flante;  
Libs frequens ante, & Pluvia, Atmosphæ-  
ra valde humida.

Pluvia  $\frac{1}{1}$ .  $\frac{11}{2}$ .  $\frac{1}{14}$ . 16. 20.  $\frac{11}{21}$ . 23. 24=  
Dig. Dec.  
1. 142.

Amplissimus Halo circa Lunam 20 H.  
10 p. m. N W 2—Parvus at valde igneus  
22 H. 9. p. m. W N W 1. Nox procel-  
losa 21 S S W 4x.

☿ Altitud. maxim. 27. 30.0. E 2x. } media 29.6 $\frac{1}{9}$ ;  
——— minim. 1. 29.2. S W 3. }  
Dies frigid. 14. 40. S S W 2. } media 33.1 $\frac{1}{9}$ .  
——— calid. 29. 28. E S E 1. }

Variolæ usque epidemicæ, quædam fa-  
tis benignæ, quædam crudissimæ, aquosæ  
nec maturantes unquam sed in Vesicis præ-  
largis facessentes Cutem erodunt; aliquæ  
magnâ

magnâ Narium Hæmorrhagiâ stipatæ;  
paucæ autem Petechiis, unde sane nescio.

Diarrhœa atque Tormina perplurimos  
exercent, nec non Tuffes acerbæ ac Cory-  
zæ : Rheumatismi multi.

Febris anginosa pustulosa graffatur adhuc plurimum: Est etiam Angina maligna ulcerosa perfrequens, putridâ cum Febre, foetidissimo Spiritus Odore, Vomitu, Alvi Fluxu, imo & interdum Faucium ipsâ Gangrænâ—in Morbo utroque facilis Pustularum, Sudorum, aut Exanthematum, Eruptio, magnâ consequente Cuticulæ Desquammatione, funesta sane sunt Signa, nefasta perarida Cutis aut lividæ Pustulæ. Tempestas est infausta admodum Tabidis.

OCTOBRI.

Ineunte & etiam exeunte *Octobri*, Cæ-  
lum ferenum & Aer tenuis fuit. Ventus  
Borealis vel Orientalis plerumque præva-  
lebat—Maximæ sæpè Pruinæ—Paulum  
Pluviæ toto Mense; quamvis Octavo Die,  
I & deci-



& decimo etiam furit Procella Pluviæ, & Grandinis, Vento à Noto, & Occidente flante—Permagnæ Rorationes,  $18^{\circ}$ ,  $19^{\circ}$ ,  $xxiv^{\circ}$ ,  $xxv^{\circ}$ ,  $xxvii^{\circ}$ , et trigesimo, manè.—

Dig. Dec.

Pluvia 6. 7. 8.  $\frac{///}{9.}$   $14=1.264.$

Maxima Pruina Die  $2^{\text{do}}$ .—

Levis AB.  $2^{\circ}$  &  $14^{\circ}$ —W N W<sub>x</sub>.—

Magnus Halo circa Lunam  $19^{\circ}$ .

$\frac{1}{2}$ Altitud. maxim. 31. 30.4. N E 1. ———— minim. 11. 29.4. S S W 1 <sup>x</sup> . Dies frigid. 22. 54. E N E 1. ———— tepid. 18. 42. W b S 1.	}	media 29.9 $\frac{12}{30}$ . media 41 $\frac{22}{31}$ .
---	---	--

Variolæ adhuc epidemicæ undique ferè. Quædam mites : Quædam crudæ, malignæ—Quædam aliæ pestiferæ cum Pettechiis, & Hæmorrhagiis. Plures Anginæ malignæ etiam, & inter Adultos—Aliquæ longè plurimæ Febriculæ anginosæ, pustulosæ. Innumeri correpti levi Anginâ, Coryzâ, Fauciumque Tumore. Medio Mense ob Pruinas, et Nebulas gelidas Rheumatismi multi, & Tussis populares.

NOVEM

## NOVEMBRI.

Nubilus erat hic Mensis, et Aër crassus: Ventus mutabilis—Initio Septentrio, aut Aquilo spiravit. Sæpe Libs, atque Aufter—Dies octavus, & decimus maxime procellofi—Vicesimo 2° Gelu acre manè; Pluvia tamen perpetua ab Horâ 5<sup>a</sup> p. m. Sol subinde a. m. Levis *AB.* ultimo Die—Sub Finem Mensis Boreas, & Septentrio prævalebant.

Pluvia 7°, <sup>8°</sup>, 9°, cum Grandine Nocte <sup>10°</sup>,  
<sup>11°</sup> Dig. Dec.  
<sup>12°</sup> 22° = 1.682.

Maxima Roratio 2°, Pruina 4°.

$\begin{array}{l} \text{☿ Altitud. maxim. 26. 30.5. N N W }^{\times}. \\ \text{————— minim. 10. 29.2. S W }_4. \end{array}$	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media } 29.9\frac{2}{29}.$
$\begin{array}{l} \text{Diesfrigid. 21. 66.0. E N E }_1^{\times}. \\ \text{————— 8. 46.0. S W }_{4x}. \end{array}$	
	$\left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{media } 52\frac{8}{9}.$

Variolæ adhuc epidemicæ, sæpè verrucosæ, paucæ cum Petechiis—Leves Anginæ innumeræ etiam inter Adultos, & in his quoque semper fere cum Pustulis. Per plurimæ etiam, & epidemicæ adhuc Anginæ malignæ pluresque jugulant. Erysipelatosæ sparsæ cum Pustulis interdum gravissimis

vissimis Aphthis stipatæ, & Narium Ulceribus.

Vix sane ulla Febricula occurrit, cujusvis Generis sit, nisi Pustulis aut Aphthis consequentibus—Per plurimi Phthisi Pulmonari laborant. Tusses ubique fere apud omnes, plus minusve—Asthma gravissimum passim frequens.

### DECEMBRI.

Varia fuit Tempestas, & Ventus mutabilis toto hoc Mense. Initio Aër tenuis, Gelu rigidum, & maximæ Pruinæ; Aquilone, vel Septentrione dominante. Circa Medium Caurus, aut Africus spiravit, haud parcâ decedente Pluviâ—Ad Finem recurrit Aquilo, vel Septentrio, comitante Gelu.

Procella xi. Horâ 3<sup>a</sup> p.m. ☿ 29.1.  
W S W 3<sub>x</sub>. Halo maxim. alb. xx.

	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	<u>///</u>	Dig. Dec.
Pluvia 8.	10.	11.	13.	15.	21	= 1.532.

Altitud.



☿ Altitud. maxim. 2. 30.7. N E 1.	} media 29.8 $\frac{8}{31}$ .
— minim. 10. 29.1. S W 3.	
Dies frigid. 30. 72.0. E N E 2.	} media 58 $\frac{16}{31}$ .
— tepid. 12. 52.0. W S W.	

Variolæ adhuc epidemicæ. Quædam valde benignæ—Quædam crudæ, confluentes, sessiles—Quædam parvæ, atræ cum Petechiis: Crustæ diu inhærescunt. Angina valde maligna frequens. Jam Eruptio non est tantum scarlatina, sed interdum Erysipelatosa. Rheumatismi, & Morbi Colici passim. Tussés innumeræ—Tumores Faucium, Colli, & Capitis undique. Plures Pthifici moriuntur.—

Finis Anni 1752.

EX-



EXCERPTA QUÆDAM

H U H X A M I I

IN ACTIS PHILOSOPHICIS

REG. SOCIETAT. LONDINENSIS

OLIM EDITA,

ET NUNC INDE RE-EDITA

A

J. COR. HUXHAM, *AM. R. S. S.*





VIRO AMCISSIMO, ATQUE ERUDITO

RICHARDO BROCKLESBY, *M.D.*

R. S. & C. M. LONDIN. SOCIO,

HÆC EXCERPTA

IN PIGNUS AMICITIÆ

INSCRIBI VOLUIT

EDITOR.

K





CASUS Rarissimus. Ex Epistola  
Doctissimi Viri J HUXHAM ad  
GUL. RUTTY, M. D. R. S.

SECR.

**N** IHI L fere quam in Pelvi Renali &  
Urinaria Vesica Calculos invenire  
frequentius : At quis unquam in ipsa Ure-  
thra Calculum Ponderis Unc. quinque  
cum Semisse invenit ? En ideo Casum  
plane mirandum.

Viginti abhinc Annis Penis cujusdam  
*Cookworthy* ob Luem Veneream, ad Mo-  
dum quasi Eunuchi Turcici, resectus fuit :  
At Vulnus nec probe curavit Chirurgus,  
nec bene sanavit ; Cicatrice quippe obduc-  
ta vix ullum Urinæ Iter, Urethra pene  
occlusa. Lotium exinde exiguiſſimo Ri-  
vulo summoque Nisu reddidit ; brevique  
inter mingendum Cruciatuſ magnus acces-  
ſit ; pauloque poſt in media, at ſuprema,  
Parte Scroti Tumor parvus, ſenſim tamen

auctus in magnam demum excrevit Mo-  
lem, lævum ad Inguen quasi vergens.  
Hinc Urinam ejaculandi impotens prorsus  
factus Stillicidio ejus continuo laboravit.  
Sed neque hac Via, Urethræ scilicet, om-  
nem emulxit; penatis enim tribus qua-  
tuorve in Scroto Fistulis, Pars forte maxima  
Lotii ex hisce defluxit, Pure subinde co-  
mitante. At ne sic quidem Tumor, jam  
admodum durus, vel minime decrefcebat,  
quinimo increvit usque.

Dira hæc inter Tormenta cum per plu-  
res jam Annos Miser hic, neglectus omni-  
no, miserrimam pertraxit Vitam ad nos-  
trum Noscomium tandem delatus fuit.  
Ibi Mense *Julio* elapso, quum summo nisu  
Urinam, solito quod dixit ardentio-  
rem, expellere, Corpus incurvando maxime,  
contenderet, ingens hic prolapsus est Cal-  
culus, quem jam Tibi misi; qui recens  
excretus Uncias quinque cum Semisse Pon-  
deris Avoird. pependit. Eum mihi pro-  
pere, quasi Monstrum quoddam, mitti  
curabant Noscomii Rectores. Rem cer-  
te

te quod debui plane mirabar Hominemque invisebam, continuo lacerum inveni Scrotum, jam minime tumidum, Manum puerilem facile admittens, & ex Urethra Calculum elapsum fuisse deprehendi\*.

Atqui id forsan haud parum Miraculo adjiciat, quod magnum hoc lacerumque Vulnus Balsamo quodam Terebinthino tantum obtinendo brevi sanum evasit, ni quod parva adhuc pateat Urinæ Fistula in superiore Parte Scroti. Atque Misellus Ille, cui ante Excretionem Calculi vix ulla se movendi Potentia, commode jam satis obambulabat.

Non ego quidem hunc Calculum in Urethra primitus fuisse enatum autumo, ab ibidem Loci ex arenosa Materia concretum maxime. Cum enim parvus forte Calculus, Semen quasi hujus enormis, è Renibus delapsus erat ; & ob Urethram fere occlusam, negato ultra Itinere, in Canaliculo substitit, Sabulo perpetim  
appel-

---

\* Vide Cas. persimilem in Hollerio de Morbis internis Lib. i. C. 49.



appellente auctus in immensam hanc Molem tandem excrevit.

*Plymouth, Id. Febr. 1729-30.*

CASUS alter perquam rarus ex  
eâdem Epistolâ.

PEPERIT nuperrime Domina quædam Puellulam rite & eleganter fatis conformatam, ni quod in regione Lumborum infima eminuerit Tumor, five Sacculus Magnitudinis quasi Pugni puerilis; cujus insuper Pedes ad Nates usque retracti Posituram Sartoris incoxantis exhibuerunt; nec eos movere ullo Modo, aut extendere, potuit. Mirum hoc & triste Parentibus visum est, mirum & Obstetrici & Matronis adstantibus: Meum ideo protinus Consilium petunt.

Tumorem hunc perlustrando cum ejusdem esse Generis cum illis, quos Tulpius, Cap. xxix, & xxx. Lib. iii. Observat. descripsit suspicabar: Istum ideo Fo-  
mento

mento aromatico & adstringente foveri jussi. Intra Triduum autem vero summe adeo distentus evasit, ut jam extima Tumoris Membrana disrupta fuisset; Metusque esset, ne rupto confestim Tumore, Serum semel & simul cum ipsa Vita efflueret. Punctiunculam ergo suasi, ut Lympha sensim emitteretur, edito nihilominus Prognostico, five aperiretur Tumor five non, eum fore lethalem.

Infans interea insomnis & ejulans parum dormivit ad Pulticulam vero satis apta.

Quarto adeo Die Tumorem aperuit Chirurgus, facto largiore paululum quam consuluissem Orificio, ita ut omnis intra Horas viginti effluerit Humor. Hinc Languor summus & frequens Deliquium ad Biduum saltem; at Nutrice sana & Julap. Cardiaco, Cephalic. refecta viceffimum ad usque Diem Vitam perduxit, quo frigidi Sudores & Tremores aborti tremulam hanc Lucem extinxere.

Inciso Corpore observavimus Dorſalem Medullam ad ultimam Lumborum Vertebra, nec ultra, pertingiſſe; ſed hanc inter & Os ſacrum (ſi mavis primum Os ſacrum) exuens per Tumoris ſive Sacculi Membranas diſpertita fuit. Os ſacrum porro fuit ſolidum penitus, nec Propagines nervoſas Medullæ ſpinalis (quibus apud Anatomicos Cauda Equina Vocabulum eſt) ad Crura Pedesque tranſmiſit; quinimo ne quidem perforatum fuit omnino.

In quibuſdam ſaltem à Tulpianis Hiſtoriis ſuper citatis differt hæc noſtra: Neque enim aliquid Matri prægnanti negatum neque vel ſe Ictu aut Fœtum Imaginatione læſerat unquam, neque Spina huius Infantis bifida aut lacera: Quinetiam nec Os ſacrum ſolidum, nec Pedes contractos & immotos meminit Tulpius. Quandoquidem ergo ſingulare quid habeat hæc noſtra Hiſtoria, hanc ego tranſcripſi.

OBSER-



OBSERVATIONES duæ rariores, ex  
 Literis Viri Doctissimi *Johannis*  
*Huxham*, M. D. ad *Jacobum*  
*Jurin*, R. S. SECR.

## OBSERVAT. I.

## INGENS OMENTUM.

VETERANI cujusdam Militis Uxor  
 Dolore colico & Vomitu diu labo-  
 raverat, quibus supervenit Ventris Tumor  
 durus, qui auctus indies magnam in  
 Molem excrevit. Jam evomuntur omnia,  
 Bilis atra, sincera, tandem & ipsæ Fæces  
 alvinæ. Dolor vero persæpe immanis in  
 sinistro præsertim Hypochondrio, Fetus,  
 Cathartica, Enemata, Anodyna, plurima  
 à Pharmacopœio *Collins* adhibentur; in-  
 cassum omnia; permanet Dolor, increscit  
 usque Tumor, Digitorum Pressui haud  
 magis cedens, quam si Lignum fuisset.

L

Ex

Ex hocce Tumore plura quasi Tubera enata sunt, quorum unum alterumve Caput puerilem, alia Pugnum virile, Magnitudine æquabant: Eminebat autem maximum in sinistro Hypochondrio, ubi gravissimum persensit Dolorem, ita ut sæpius exclamaverat se voluisse Tumorem ibidem Loci fore perfossum.

Increscente Tumore facta est valde dyspnoica. Tanta tamque atrocita per Menses fere 14 perpeffa fuerat Mulier, cum tandem grata venit Morborum Requies, Mors.

Mihi enarravit Casum Pharmacopola, rogavit insuper ut Viscera inciso Abdomine inspicerem, quod cum alio Medico feci perlubens.

Nudato Cadavere montosum observavimus Ventrem; reliquum vero Corpus summa Macie confectum. Secto Abdomine in Conspectum se dedit ingens quasi Sebi Massa (nisi quod Colore fuit minus alba) totum Ventris cavum adimplens, ita ut  
nec

nec Ventriculus, nec Jecur, nec Intestina apparerent ulla; adhæserat enim Omentum hoc enorme Peritonæo pluribus in Locis, in utroque præsertim Hypochondrio, ubi & latior & firmior fuit Cohærentia. Secto autem in Modum Crucis Peritonæo, & ab Omento separato, conspeximus Ilium in Pelvim fere detrusum, Omentum etiam toti Jecinoris Cavo annexum, Ventriculum hac Mole oppressum, uti & Duodenum, Colon & Jejunum: Cum adiposo Renum Involucro (sinistro præcipue) connexum & quasi confusum fuit; adeo ut Colon, altius paulo quam in Rectum definit, Sebo hocce concreto fuit penitus involutum. hinc Fæcibus præclusum Iter, hinc illæ Lachrymæ, hinc Dolores illi sævissimi, quibus ante Mortem excruciatâ fuerat Mulier: & ut hic obiter notem, per plures Dies ante Mortem nec suâ Sponte nec vel Clysmatibus acerrimis irritata Alvus Fæces dejecerat ullas.

His lustratis ingens separavimus Omentum à Jecore, Ventriculo, schirroso Pan-



create, Intestinis, tandem & à Mesenterio, & ab interna Peritonæi Lamina Renibus instrata. Splen fuit hac Massa quodam Modo demersus, contractior, & quasi coriaceus. Hunc quasi Sebi Montem exemi denique & per Famulum nostrum Domum misi : Erat autem Animus Omentum hoc morbidum accuratius perspiciendi, cum jam enim advesperasceret defuit Opportunitas.

Pendebat Omentum hocce lb. xvi  $\frac{1}{2}$  *Avoird.* nec tamen abstulimus unam saltem alteramve Libram Partibus adhærentem. Pondus hercle maximum ! si consideremus ex obesiore Homine Omentum vix Libras pendere tres, majus certe inveni antehac nunquam, quanquam & secui & dissecta vidi plurima Hominum Cadavera. Fateor equidem longe majus à Gregorio Horstio in suis Observat. memoratum fuisse, majus etiam in Ephemerid. *German.* Ann. x. veruntamen hoc quoque nostrum Monstris annumerari merito debet.

Hujus

Hujus & in extima Parte, nec non in interiore Substantia, plura observavi Vasa sanguinea, eaque certe maxima dilatata, quorum aliqua Penna anserina majora, aliqua vero quasi in Aneurismatibus terminantia. Ex horum Aneurismatum (si ita dicam) maximo Uncias circiter sex nigricantis Sanguinis extraxi cum quibusdam Grumis albidioribus; anne Adipis Particulæ à Venis epiploicis absorptæ atque Morbo congelatæ?

Ex plurimis Lobis conflari mihi videbatur Massa hæcce sibi invicem arctè adhærentibus; aliquos tamen separavi, quorum pauci Pomo minori fuere Magnitudine æquales, Forma haud abfimiles. Media hujus pars cætera durior, Cultro haud facile cedebat.

In isthoc Cadavere sequentia etiam fuere observatu digniora. Inferior Hepatis Pars in Schirrum abierat. Ex Vesica fellea plures exemi Calculos, Carbonem fossilem Colore

lore referentes, friabiles, Aquam innatantes, quos Bilem haud improprie nominares splendidam ; his quippe quum inerant plurimæ Particulæ micantes haud dubio salinæ.

Mesenterii Glandulæ fuere schirrosæ, imo quædam in Substantiam pene lapideam induratæ. Intestina tenuia fuere inflammata, Colon cum Cæco fere totum Gangræna correptum, etiam Processus ipse vermicularis.

Ren uterque fuit sanus satis : Dexter autem emisit Ureteres duos : Cum vero Renem dissecuisssem, percepi facile, quid esset in Causa, cur Ureter hic fuit duplex. Renis enim Pelvis Septo quodam fuit divisa, Digitum transversum crasso, ejusdem perfectè Substantiæ cum reliquo Renis Parenchymate.

Hic fuit Ren quasi duplex, cui duplex Pelvis, Ureterque duplex.

Erant



Erant in imo Abdomine Seri subcruenti  
Libræ quasi duæ.

Malum hoc immedicabile penitus visum  
est, nisi quis Morbi Principiis obstitisset.

## O B S E R V A T. II.

### *Salivæ Color insolitus.*

**D**OMINUS Fox, quadragenarius,  
gracilis, biliosus, per Mensem unum  
alterumve elanguerat, Nausea, Ictero, &  
Doloribus colicis vexatus: Tandem ex epo-  
to largiter Vinò pomaceo vehementissimo  
Colices Paroxysmo correptus me consulit.  
vomitabat omnia, Urinæ parum reddebat  
Coloris lixivii, quæ Sedimenti plurimum  
deponebat subviridis.

Ego statim illi Potionem ex *Ipecac.*  
Emeticam propinari jubeo, infuso dein  
*C. Bened.* affatim hausto plurima viscosa,  
biliosa, rejecit: Tum Enemate *Terebinth.*  
injecto Alvus bis terve respondit. Ex sump-

ta Mistura anodyna Vomitus & Tormina comprimuntur; jam de Languore summo & Abdominis Distentione Conquestio; paulo etiam post recrudescit Dolor.

Bolum præscripti ex Jalap. ℥i, Calomelan. Gr. viii, Spec. Diambri. Gr. vi, Laud. solid. Gr. i, Syrup. de Sp. Cerv. q. s. quam primum sumend. cum Tinct. sacri. ℥ii. Hinc omnia pacata post Horas 12 ter fundit Alvus perliquida, biliosa. Ex sumpto dein Haustu anodyno Nox tranquilla. Mane de Dolore & Faucium Tumore queribundus crassa, subfusca, expuebat; mox abunde effluit Saliva Colore viridissima, Bili porraceæ quam simillima, nisi quod tenuior. Perduravit Fluxus hic Salivæ viridis Horas quasi 40, quo Tempore sputavit quantum vix caperent Sextarii duo: Ad Flavedinem dein vergebat Color Fluoris eo usque dum ad instar Solutionis Gut. Gambæ evasit: Quantitas autem aucta potius quam diminuta.

Perstitit

Perstitit & hicce Color per Horas etiam quadraginta, dein sensim pellucida facta est Saliva, atque subito, uti oborta est, evanuit penitus Salivatio.

Intra Biennii Spatium bisterve in Icterus incidere ante hujus Morbi Accessionem. Decem abhinc Annis maxima Salivatio Sponte erumpens hunc ipsum Hominem in summum Vitæ Discrimen intulerat; salvus autem evasit Ope doctissimi expertissimi-que Medici D. D. *Pyne*. Tunc vero Temporis ne vel 8 ii Hilum sumpserat, nec ullo Modo fuerat colorata Saliva.

In hac Historia observatu haud indigna quædam occurrunt. Salivatio nempe Sponte exuscitans, vel ex tantillo forsan Calomel excitata. Calomel autem probe paratum novi, quippe qui plurimas ejusdemet Doses, quarum aliquas ad Scrupul. integrum, exhiberi jufferam, ne vel minimo sequente Salvationis Signo.



Occurrit porro, quantum ego saltem scio, Salivæ inauditus Color. Saliva viridi ita penitus tincti erant Dentes & Fauces quasi Æruginè obducti fuissent: Permanfit Dentium Color viridis quatuordecim post Diebus quam convaluit.

Notandum præterea Fluxum hunc Salivæ fuisse criticum, quo judicatus est & Icterus & colicus Morbus; ab inceptante enim Salivatione ne vel minimus Dolor Ventris, & Color Cutis subviridis sensim evanuit, Urinam etiam reddit copiosius, sed subnigram. Ille vero, qui ante hunc Fluxum valde languidus fuit & jam quasi moribundus maximam Salivæ Evacuationem ἐνφέρως φέρει.

Serum Ictericorum tinctum esse Bile omnibus notum est: Nec alicui forsitan videatur magis mirandum Serum flavum posse per Glandulas salivares excerni quam per serosa Cutis Vascula, quod tamen Ictero laborantibus contigisse sæpe observavimus,  
admoto

admoto prius Epispastico : De Urina biliosa nihil dicam. Unde vero Color Salivæ viridis haud ita facile dictu. Hujus opinor ego Causam procatarticam esse pomacei Vini Potationem.

Bili si miscueris Acidum Color oritur viridis. Hinc torminosæ Infantum Dejectiones virides, Lacte in Ventrem acescente. Hinc porracea Bilis. Ponamus jam Acidum pomaceum à Venis lacteis vel & à mesaraicis forsan, absorptum, Seroque Sanguinis bilioso permixtum : Quid eveniret deinde ? Credo equidem flavi Seri Coloris in viridem Permutatio. Profiteor hercle, Acida quæcumque à Vi Corporis vitali in alcalinam Naturam mutantur, etiam ipsum Vitrioli Acidum : Languescentibus autem Viribus, Concoctione læsa, Lympha effœta facta, facta & inerte Bile, queis adde Sanguinem tardius circulantem, acida parum subacta, nec in primis Viis, nec in ipso Sanguine, acidam exuunt Naturam. Hoc testantur acidi debilium Sudores, acidusque in Ore Sapor à Febris



inflammatoriis convalescentium, quibus ad  
 restinguendam Febrem largius fuerat acidus  
 Potus. Sæpius certe memini me Vinum  
 pomaceum largiter potâsse brevique Uri-  
 nam ipsissimum Potus Odorem spirantem  
 reddidisse. Curabam nuperrime Mulierem  
 summa Hæmorrhagia, durante diu, cor-  
 reptam, cui inter cætera plurimum fuerat  
 exhibitum Elix. Vitriol. *Mynsich.* cessavit  
 tandem Hæmorrhagia; debilis autem inde  
 reddita Mulier incidit in leves Spasmos,  
 Artuumque Dolores, Ventris Tormina  
 Diarrhœa comitante, plures excrevit Alvus  
 Dejectiones viridissimas, Sercoris vaccini  
 simillimas, talesque per plures Dies, quan-  
 quam Rhabarb. fuerat ter exhibitum ad  
 expurgandas Acidi Particulas, Intestinis  
 adhærentes.

Hic Sal acidus Sanguini immistus, post  
 Dies plures iterum è Sanguine per Intestina  
 rejectus est, Vi Vitæ nullo fere Modo sub-  
 actus.

Micro-



Microscopio olim observavit *Leeuwen-hockius*, quod Chyli Sales acidi à Bile redundantur & comminuantur, quum vero in Jecore subsistat obstructa Bilis, integris Viribus Vasa lactea permeat Acidum. In ægroto autem nostro Bilem obstructam fuisse, patuit inde, quod Alvus fuerat compressior, & Fæces ante Vomitus Medicamento commotum reddidit albidas.

Hypothesis fortasse nostra illustretur magis, si perpendamus unde oriatur Virginum  $\kappa\alpha\chi\epsilon\kappa\lambda\tilde{\omega}\nu$  Color herbeus (ut cum Plauto loquar). His enim Fructus immaturi, Acetum atque id Genus alia, summæ sunt cupiditæ, vitiatæ autem Concoctionis Organis, parum immutata Sanguini miscentur, Bilemque & Sanguinem obruunt Acido. Hinc Glandulæ obstructæ, hinc Facies ex viridi pallida, Tumor hinc hydropicus ; atque quod non est levis Momenti Jecur schirrosus ex Chlorosi præmortuarum sæpe inventum fuit viride. Jam paucis restat dicendum unde Colori Salivæ

Salivæ viridi successit Color flavus, quod inde factum arbitror, quia post Acidum à Sanguine partim abligatum, partim & à Motu Sanguinis, ob Cardiaca exhibita, aucto destructum, superfuit solum superflua Bilis Sanguine expellenda, quod & brevi secessit, referatis Bilis Poris, & per patulos Salivæ Ductus mirandum in modum excreta.

Partium Genitalium in Muliere  
Structura præternaturalis. Ex  
Epistola Viri Doctissimi *Johannis  
Huxham*, M. D. ad *Jacobum  
Jurin*, R. S. SECR.

*Plimutbo*, v° Kalend. Octob. 1723.

*A. B.* de Parochia *Lantiglass* in Comit.  
*Cornubiæ*, prope *Fowye* Oppidum, Annos  
nata xxiii nupta fuit cuidam Nautæ robusto,  
tandemque prægnans, sibi Partium male  
conformatarum conscia, Opem imploravit



vit chirurgicam. Sibi accersitum esse voluit Dominum *Bonnett de Fowye* Oppido, & Artis chirurgicæ, & obstetriciæ peritissimum. Ille vero perspecto denu- dato Corpore sequentia observavit.—

Loco Umbilici in medio Abdomine, paululum vero inferius, prominet Massa quædam spongiosa, Carnis quasi Offam præ se ferens, Abdomini transverse incum- bens, Magnitudinis fere Ovi gallinacci, longa autem tres Digitos: Ex hac duo erumpunt Meatus urinarii, qui Urinam perpetim extillant, quam neque vel reti- nere, vel ejaculare potest; hinc Vesicam (si quæ adfit) Sphinctere caruisse concluden- dum. Spongiosa hæc mollisque Massa, Urinæ Acrimonia corrosa, Tactum fere re- fugit mollissimum, adeo ut incurvata ob- ambulare coacta sit, ad Dolorem à Vestibus impressum evitandum, eamque tenuissimis Linteis involvere. Hanc quidem Massam Funem fuisse umbilicalem male à Partu abscissum, male dein curatum, existimo; ne vel minima enim Umbilici, nisi hic, appa-



apparent Vestigia ; quid quod & Urina per Urachum pervium, & in duos forsan Tubulos divisum, vel saltem per Canales duos proprios, effluit. Priori potius credo Opinioni ; quia dantur Historiæ Urinam per Umbilicum in Adultis etiam excretam fuisse attestantes. Vid. Hist. de L'Academie Royale des Sciences, Ann. 1701.

Hanc infra Offam subintrat Vaginæ Foramen, ab Offa distans brevissimo Spatio : Ex hoc effluxere Catamenia, per hoc etiam gravida facta fuit Mulier, haud magnam vero Tempore Coitus percepit Voluptatem ; summa enim Penis Glans in hoc Orificium vix fuit intromissa, multo minus ipsa Virga. In hoc Foramen Digitum ægrè introduxit Chirurgus, eo scilicet Animo, ut ipsum Uteri Collum exploraret, quod tamen ne vel Tactu percepit, planè autem deprehendit Membranam crassam hocce Orificium ab altero inferiore, jam describendo, separantem.

Eo ferè ipso Loco, superius vero paululum, ubi in Mulieribus ritè conformatis adest Fossa magna, inventum fuit Foramen alterum oblongum, ne vel minimi Digiti Apicem altius admittens, Recto Intestino, uti post Partum observatum fuit, pervium (quod à Sectione fortasse accidit): Nullus autem hic occurrit Sphincter: Inferius vero Rectum Intestinum, More solito, cum Sphinctere circumdato terminatur.

Orificium hoc oblongum ab Orificio Vaginæ, Abdomine maxime Tumente, duos saltem Digitos transversos distat, inter quæ Membrana descripta intervenit ab interiore Parte, hujusce vero Fissuræ oblongæ quasi Labiorum coalitio exterius e superiore Foraminis Parte.

Nulla hic Clitoris, hic nulla Ossium Pubis adfuere Vestigia, nisi, quasi Apophyses breviores ex utriusque Ossis Ilii Parte inferiore protuberantes, Ossium Pubis Rudimenta dixisses. Hic fuit ante Partum Rerum Status. Die 18 Julii, 1722,

Horâ Noctis 11<sup>a</sup> advocatus est *Bonnet* Chirurgus, ut parturienti Opem ferret. Perpenſis omnibus, Fœtum invenit Vaginæ Orificium infra dilapſum, quem Muliere decumbente ſuperiora verſus propellere fruſtra adnixus eſt, ob fortiffimos Fœtus Motus & graviffimos Matris Dolores, cui etiam jam ſupervenere Convulſiones, Syncope, &c. Vaginæ autem Orificium vix ac ne vix quidem dilatatum, ita ut illi jam jam moriendum eſſe fuerit omnium Expectatio.

In hoc miſerrimo Rerum Statu, Miſericordia & Humanitate adductus Chirurgus, poſthabuit omnino, quid vel ignarum Vulgus, vel invidus hic garriret aut hic: Anceps experiendum eſſe Remedium potius quam nullum apud ſe ſtatuit, Morte aliter citiffimo ingruente Pede.

Parentibus periculofum Rerum Statum enarravit, nil niſi à Sectione expectandum, ancipitem prædixit Eventum.



Annuentibus hujus miserrimæ Matre, & astantibus, in Orificium oblongum inferius Scalpelli Chirurgici introduxit, & uno Ictu Coalitionem Labiorum hujusce Orificii & Membranam separantem divisit: Hinc in unum coivere & Orificium Vaginæ & oblongum inferius. Jam Digitis facilis Introitus, Orificium Uteri internum attrectavit; dilatavit paululum, Caput inde sensit Infantis: Quid plura? Fœtus Ori intruso Digito, Puellulam vivam, probe formatam, mirantibus maxime astantibus, demum extraxit, quæ & adhuc & viget & valet: Uti etiam & ipsa Mater, quam post Puerperium Febre graviter coluctata est.

Jam à Partu Prolapsu ipsius Uteri divexatur, quo prolabente nec per Horas 8, 10<sup>ve</sup> reducto, eam dein si fortius intrudas, exiliunt è Meatibus urinariis descriptis Rivuli duo ad Pedis saltem Distantiam; Argumentum sane Cystidis cujusdam Urinam excipientis: Aliter revera suspicasset Meatus istos duos urinarios ipsorum Ureterum fuisse Orificia, hic terminantia.

Quærat fortasse curiosior aliquis, quo forte Modo gravida facta fuit Muliercula nostra. Illi responderem, Penis Intrusionem ad Prolem concipiendam haud absolute esse necessariam, Seminis autem intra Vaginam Ejaculationem quam maxime. Vid. *Hist. de l' Acad. Royale des Sciences*, 1712. Videatur etiam *Mauriceau*.

Hujus Rei Narrationem tibi citius transmississem, ni diu, frustra autem hætenus, Mulieris alteram Graviditatem expectassemus, quum per sat longum Tempus à Puerperio cum Marito cohabitaverit.

Vide Figuram Mulieris gravidæ  
p. 102.

A A. spongiosam assimulat quasi Carnis Massam, quam Partem fuisse Chordæ umbilicalis autumo, Magnitudinis fere Ovi Gallinacei, tres vero Digitos longam. Ex hac duo erumpunt Fistulæ urinariæ *bb*, quæ Urinam perpetim extillant, nec ex ullo alio Orificio redditur Urina.

c. Ori-

c. Orificium Vaginæ, Cloacæ Galli Galinacei quam fimillimum, spisso quasi Septo circumdatum : per hoc effluxere ἔμμηνα, per hoc etiam gravida facta fuit Mulier. Hoc Orificium, dum perpeffa fuit Mulier graviffimos Partus Dolores, nullo fere Modo dilatatum fuit, quanquam Anus ipfe, ob vehementiffimos Mufculorum Abdominis, &c. Contractiones, maxime hia-  
aret,

d. Locum indicat, ubi inventum fuit Foramen oblongum, minimi Digiti Apicem vix admittens. In hoc, Tempore Puerperii, Chirurgus introduxit Scalpellum chirurgicum, idque ab hoc in Orificium fuperius adegit : Ita ut jam à Partu dehifcat monftrorfum horrendum informe ingens Foramen.

Orificium fuperius tranfverfum ab inferiore oblongo (appropinquante Partu) 2 fere Digitos diftitit. Ex hoc magno Hiatu ipfius Uteri Prolapfum fæpiſſime nunc patitur. Ex Loco etiam, ubi adfuit olim Ori-




Orificium inferius, jam à puerperio, partim excretæ sunt Fæces alvinæ : Hoc vero ante Partum minime observatum fuit, ita ut à Sectione forte acciderit.

Orificium hoc oblongum paulo altius quam par est in Figura designatur.

*e.* Anum repræsentat paulo magis antrosum quam in aliis positum : Per hunc maxima Fæcum Pars egeritur.

Pudendum hoc, quale quale, est non dense crinitum.



EPISTOLA ad JACOBUM JURIN,  
*M. D. R. S. & Coll. Med. Soc.*  
 De Morbo Colico singulari.

**V**IR quidam quadragenarius, biliosus, scorbuticus, inter Optimates Damnonios haud infimus, nuper interiit, Pietatem propter erga Deum, propter universam erga Homines Charitatem, ab omnibus maximè desideratus.

Diu ille multumque Colicis quibusdam Doloribus, inferiorem præcipue Abdominis Regionem infestantibus, laboraverat, Flatu porro perpetuo & molesto. His Biennium circiter, aut Triennium ante Mortem, accessère Dejectiones biliosæ, purulentæ, fœtidissimæ, cum Strigmentis sæpè mucosis, sæpè sanguineis; ita frequentes insuper, ut persæpè intra tres, quatuorve Horas Alvus vel vices solveretur persistente usque Tenesmo: Tandem quoque prodière Carunculæ fungosæ, lividæ, tetræ, quarum aliquæ Magnitudinis saltem

Nucis

Nucis Myristicæ. At vero utcunque Alvus citissimè ægrotum plerumque exercebat; nonnunquam tamen Morbo præsertim ingruente, foret adstricta valdè cum horrendo Tormento; nec nisi Clystere ducta, aut Catharticis irritata responderet. Subindè quasi Famelicus oblata quæcunque voraret; subindè ne quidem Delicatula vel ad Dapes exquisitissimas, placerent: Æger autem indies emacuit.—Fuit illi Urina parcior, & semper biliosa: Color Vultus luridus, sæpe subflavus.

Tam dira, tam longa Mala infracto admodum fortique planè Animo pertulit, donec supervenerunt demum Tumor Pedum œdematosus, Delirium, Facies *Hippocratica*, Sudor frigidus & oleosus, certa, eheu, nimis certa! Mortis Prænuncia.

Varia fuerunt à variis præscripta Medicamina, iisque utique in Arte exercitatissimis celeberrimisque Viris; ex Ipecacuanâ Scilicet *Emetica*, Stomachica, Deobstruentia, Glutinantia, Balsamica, Adstringentia,



gentia, Clysmata multifaria, omnigena; incassum omnia, ni quod Laudanum, ad breve Tempus, foret misero Solamen.— Quid Aq. Bristol. & Bathoniens. quid Spadana & Pyrmontens. quid, obstinata, quid accuratissima è Lacte & vegetabili Diætâ potuerint, inani omnino Operâ experiebatur; ut ut per breves aliquot Dies aliquando recreatus videretur.

Sicut Vir optimus, dum viveret, omnibus prodesse alacriter, assiduè studebat; sic, vel moriens, se Publico devovit Commodo; rogans obnixè, ut, Cadavere inciso, Causam Morbi tam pertinacis, tantam eludentis Artem, perscrutaremur; ut melior fortè, detectâ nempe Causâ, pateret medendi Methodus, si quis alius forsân tali corriperetur Morbo.

Aperto Abdomine perspeximus *Omentum* consumptum planè & putridum, *Hepar* prætumidum, et schirrhosis Tuberculis, subalbidis, duris refertum: Vesiculam Felleam Bile subnigrâ semiplenam;

totum Duodenum cum vicinâ Coli Parte eodem Colore perfusum ; Pancreas maximè schirrosus : Mediam Ilei Partem ad 5 ferè Digitos inflammata, & ferè livida. Renes erant sani satis, nec Glandulæ Mesentericæ æquè schirrosæ, ac expectâstemus.

At quod maximè notandum, Pars Coli Intestini suprema, quam Veteres Cæcum nominârunt perperam (cum id potius ejusdem Appendici, ab iisdem ita nominatæ conveniat) in hocce Cadavere non, quod affolet, Reni dextero, seu potius internæ Peritonæi Laminæ Renem contingenti, adnexa fuit, mediante Appendice vermiculari, sed in Pelvim delapsa tres circiter infra Tulpii Valvulam Digitos cum superiore Parte Intestini Recti firmissimè concreverat : Porro levius adhæsit Peritonæi Tunicæ super Vesicam urinariam expansæ, sursum indè reflexa, faciens cum superiore Intestini Parte, (si ita dicam) Angulum valde acutum, sub cavo dein Hepatis ascendens & infra Ventriculi Fundum

dum porrecta descendebat More solito & in Rectum definebat. Cum primum autem notavimus ambo Intestina & supra infraque AdhæSIONem Gangrænâ affecta esse, suspicantes hic latuisse Fundamenta Malorum, cautè admodum lentèque processimus Scalpello, imprimis aperiendo Rectum Intestinum, quod ubi factum, vidimus internam Tunicam sphacelatam omnino, nigram quasi Atramento imbutam & maxime putidam ; huic porro adhærentes sex septemve Carunculas subnigras, fungosas, quarum minores Magnitudine Nucem Avellanam æquabant. Perscrutantes ulterius, Ulcus percepimus ex hoc Intestino in Colon, ubi cohærebant, penetrans, Digito mediocri facilè patens : Intestina vero adeo putrida, ut vix Tactum ferrent leviolem. Majorem Coli Partem Excrementis induratis observavimus infarctam, etsi plures liquidas Alvi Dejectiones habuit, paulo ante Mortem ; tenuioribus nempe directè in Intestinum Rectum per ulceratum Orificium transeuntibus ; solidioribus autem in Colo restantibus.



bus. Vesica urinaria fuit flaccida valdè intusque Muco subrufo oblita.

En ! fidam utique licet minus elegantem Morbi Historiam ! En quid inciso Corpore perspectum ! Ex quibus Conjectura haud difficilis, quæ fuit Causa Morbi : Ex Anatomicis enim notum est, quod Concretio Intestinatorum inter se aut cum Peritonæo, Motum Peristalticum minuit maximè. Vid. *Cowperi Anatomiam. explic. Tab. 34.* Unde ad Locum Conglutinationis tarda admodum debilisque Excrementorum Impulsio, eorundem Congestio, Remora sequentibus ; fortè duris & acutis lædentibus, qualia Offa Prunorum deglutita, aut tale quid ; fortè acribus & biliosis Humoribus non satis valide motu vermiculari propulsis, sed ad Angulum Coli acutum subsistentibus ; exinde aut Intestini Inflammatio, aut Corrosio, Ulcus denique sequebantur ; tandemque in Homine valdè Cachectico Gangrena.

Plymouth, Prid.

Id. Mart. 1739.

F I N I S.

